

缘，浅黄色，外侧黑色，并扩展至亚端区，外区前缘脉上有3个黄色点；后翅褐色；雄蛾后翅长，顶角尖锐，翅前缘长于前翅；腹部黄褐色，背面带暗褐色。

分布 福建、海南、江西；印度，印度尼西亚，马来西亚。

毛尖裙夜蛾 *Crithote prominens* Leech (图版 LXII-7)

Crithote? prominens Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 572. (湖北长阳)

体长 12 mm；翅展 30 mm。头部与胸部暗灰褐色，下唇须黑褐色，额有向前伸的毛簇；前翅暗灰褐色，雄蛾前缘区 2/3 灰色带紫色，成一纵长条，其内端后缘达翅后缘，外端后缘外斜，中室后半之后带黑褐色；后翅暗灰褐色，无明显斑纹；腹部褐灰色。雌蛾前翅灰色纵长条在内区分出一外斜条达翅后缘，斜条内缘后部向内扩展，使内区后部成一黑斑，斑的外围衬白色。

分布 湖北、海南。

哈夜蛾属 *Hamodes* Guenée

Hamodes Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 202.

Type-species: *Ophiusa propitia* Boisduval.

Kalmina Swinhoe, 1891, Trans. ent. Soc. p. 480.

喙发达，下唇须向前伸，第二节小，雄蛾触角有短纤毛丛；胸部具鳞片，胫节无刺；前翅前缘在顶角处常很拱曲，顶角尖锐而成钩状；后翅臀角平截。

种 检 索 表

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. 前翅顶角强外突而尖 | 2 |
| 前翅顶角稍外突 | 斜线哈夜蛾 <i>Hamodes butleri</i> |
| 2. 雄蛾前翅前缘外半强拱 | 哈夜蛾 <i>H. propitia</i> |
| 雄蛾前翅前缘不拱曲 | 暗纹哈夜蛾 <i>H. mandarina</i> |

暗纹哈夜蛾 *Hamodes mandarina* (Leech) (图版 LXII-8)

Thermesia mandarina Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 570. (四川)

Hamodes mandarina: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Draudt, 1950,

Mitt. munch. ent. Ges. 40: 167. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4:

143. pl. 14, fig. 279.

翅展 48 mm 左右。头部与颈板深黄褐色杂黑褐色，胸部背面赭褐色；前翅赭褐色，布有黑褐色细点，前缘区内半部较致密，内线黑褐色，自中室直线内斜至后缘，环纹为一黑点，肾纹隐约可见，其内缘中部有一黑点，外线黑褐色，自近顶角处直线内斜至后

缘中部，外侧衬黄色，在6—7脉间与一自前缘脉外斜的曲纹相遇，亚端区有极模糊的暗褐曲纹，翅外缘有一列黑点；后翅色同前翅，横脉纹黑褐色，翅中部有一黑褐色内斜直线，其外侧衬黄色，亚端区有二暗褐色波浪形线，翅外缘有一列黑点。

分布 福建、四川。

哈夜蛾 *Hamodes propitia* (Boisduval) (图版 LXII-9)

Ophiusa propitia Boisduval, 1832, Voy. Astrolabe. Lep. p. 244. (新爱尔兰岛)

Hamodes aurantiaca Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 203.

Ophisma attaccicola Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1383.

Hypernaria discistriga Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 78.

Hamodes marginata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 169.

Hamodes aurantiaca: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 548.

Hamodes propitia: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 38.

翅展 61 mm。全体浅黄色，头顶杂有黑褐色，额上部有一“V”形纹，下部两侧有黑纹，下唇须外侧浅褐色，前足胫节与跗节灰褐色，中、后足胫节外侧杂有黑褐色，中足跗节灰褐色；前翅布有零星黑褐细点，环纹只现一黑点，肾纹仅在中室下角现一约呈三角形黑纹，其前方的前缘区有一模糊黑褐斑，其外方另有二微弱黑褐斑，顶角后有一隐约褐纵条，亚端线黄色外侧衬暗褐色，自顶角微曲内斜，前半外方带有褐色，成模糊斑纹，后半外侧有隐约褐线，缘毛褐色，翅前缘外半稍拱曲，顶角强外突；后翅前缘区及端区散布黑褐细点，外线黄色，较直，亚端线由黑褐细点丛组成，较宽，微波曲，隐约可辨。

分布 海南；缅甸，锡金，印度，菲律宾等。

斜线哈夜蛾 *Hamodes butleri* (Leech) (图版 LXII-10)

Thermesia? butleri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 570. (峨眉山, Chow-pin-sa, Kei-chow)

Hamodes butleri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 167. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370.

翅展 44—54 mm。头部灰棕色，额黑色，下唇须第一节及第二节基部外侧白色，后者约呈三角形，其余黑色，第二节背、腹端饰毛；胸部灰棕色；前翅黄褐色，基部色较暗，内线黑色，不清晰，自前缘脉外斜至中室折向内斜，环纹只现一黑点，肾纹大，灰色黑边，前方有一暗棕色纹至前缘脉，外线不明显，仅在前缘脉处现一黑纹，亚端线黑棕色，自顶角直线内斜至翅后缘，线内侧衬红褐色；后翅黄褐色，前缘区淡黄色，一棕色线自前缘区后内斜至翅后缘，线内侧衬红褐色；腹部黄褐色，有黑点。

分布 湖南、福建、海南、四川、云南、贵州。