

种 检 索 表

- 肾纹及前翅亚端线有黄斑 延夜蛾 *Hecatera dysodea*
 肾纹及前翅亚端线无黄斑 两色延夜蛾 *H. bicolorata*

延夜蛾 *Hecatera dysodea* (Denis et Schiffermüller) (图版 XVIII-20)

Noctua dysodea [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 72. (奥地利)

Polia subflava Warren, 1909, in Seitz, Maceolep. World 3: 75.

Polia spinaciae: Warren, 1909, in Seitz, Maceolep. World 3, 169.

Polia dysodea: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 169.

翅展 34mm。头、胸灰色杂褐、黑色；前翅灰白色，密布黑褐细点，中区色较暗，亚中褶带有黄色，基线、内线及外线黑褐色，内线波浪形，杂有黄色，内侧衬白，外线锯齿形，外侧衬白，环、肾纹黑边，两侧杂黄色，中线暗褐色波浪形，亚端线间断为褐点列；后翅褐白色，端区暗褐，1、2脉端灰白色；腹部褐灰色。

分布 新疆；中亚地区，克什米尔地区，亚洲西部，欧洲。

两色延夜蛾 *Hecatera bicolorata* (Hufnagel) (图版 XVIII-21)

Phalaena bicolorata Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (4): 410. (德国)

Noctua serena [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 84.

Polia serena: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 170. ——Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 74.

翅展 36mm。头、胸及前翅灰白色，后者内、外线间带黑褐色，基线、内线均双线黑色，波浪形，剑纹黑边，环、肾纹黑褐色，外围白色及黑边，肾纹后端稍内突，中线黑色波浪形，外线双线黑色锯齿形，线间灰白色，外侧衬黑褐色，亚端线不明显，灰白色，内侧一列黑齿纹，外方有细黑褐点；后翅黄白色，端区带有褐色，翅脉纹暗褐色；腹部褐色，基部白色。

分布 黑龙江；中亚地区，亚洲西部，欧洲。

安夜蛾属 *Lacanobia* Billberg

Lacanobia Billberg, 1820, Enum. Ins. Mus. Billberg. p. 87.

Type-species: *Phalaena w-latinum* Hufnagel.

Diataraxia Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 219.

Aethria Hübner, [1821] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 218.

Peucephila Hampson, 1909, Trans. ent. Soc. Lond. p. 461.