

网夜蛾属 *Heliophobus* Boisduval

Heliophobus Boisduval, 1829, Meth. Eur. Lep. p. 69.

Type-species: *Phalaena saponariae* Borkhausen.

Neuria Guenée, 1841, Ann. Soc. ent. Fr. 10: 24.

Neuria Agassiz, [1847] 1846, Nom. zool. Index Univ. p. 249.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘有毛，第三节短，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角线形，有纤毛；胸部毛与鳞片混生，前胸一般有分裂的毛簇，下胸有长毛，胫节有长毛；腹部第一节背面有毛簇，基部有绒毛，两侧有毛；前翅稍窄，翅端尖形，外缘斜曲，缘毛锯齿形，有副室。

雄蛾抱器腹端成一长弯突，有发达的冠。

种 检 索 表

1. 前翅外线强外弯 角网夜蛾 *Heliophobus dissectus*
前翅线曲度平稳 2
2. 前翅外区各翅脉衬浅纹 网夜蛾 *H. reticulata*
前翅外区各翅脉不衬浅纹 织网夜蛾 *H. texturata*

角网夜蛾 *Heliophobus dissectus* Walker (图版 XIX-11)

Heliophobus dissectus Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 656. (斯里兰卡)

Hadena dissecta: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 212. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 301.

翅展 43mm。头、胸红棕杂黑色；前翅底色褐黄，大部带黑棕色，基线黑色，外侧衬赭黄色，内线、外线、亚端线黄色，内、外线中各有一黑色线，剑纹黑边，环纹斜，黑色，肾纹黄色，中有黑环，亚端线在 3、4、7 脉处成外突齿，线内侧一列黑齿纹；后翅褐色，基部色浅；腹部棕褐色。

分布 浙江、湖南、福建、海南、云南；日本，菲律宾，锡金，斯里兰卡。

网夜蛾 *Heliophobus reticulata* (Goeze) (图版 XIX-12)

Phalaena Noctua reticulata Goeze, 1781, Ent. Beytrage, 3 (3): 254. (未注明模式产地)

Heliophobus reticulata: Sugi, 1965, Tyo to Ga 16: 50—1. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 301. ——Meyer, 1985, Letz. ent. Z. Jg. 6 (4): 9.

翅展 40mm。头、胸褐色杂灰、黑色；前翅暗褐色，翅脉纹白色，各横线白色，基线两侧黑色，环纹斜，中央黑色，外围白圈，肾纹中央有黑扁圈，白边，剑纹大，黑