

*Chloridea nanna*: Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World, 3: 247.

*Heliothis nanna*: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 76. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.160.

翅展 29 mm。头、胸及前翅浅赭黄杂白色，前翅中线曲带状，肾纹黑色，中有灰曲纹，外线与亚端线间褐黑色，成一宽带，内方前缘脉有一黑纹；后翅浅赭黄色，横脉纹大，黑色，端带黑色较宽，2—3 脉端部一浅赭黄曲纹；腹部浅赭黄色。

分布 西藏。

### 狄实夜蛾 *Heliothis dejeani* Oberthur (图版 VII-6)

*Heliothis dejeani* Oberthur, 1893, Et. ent. 18: 44, pl. 3, fig. 40. (康定)

*Heliothis dejeani*: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 22.

*Chloridea dejeani*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 40. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 246, pl. 501.

翅展 27—32 mm。头、胸及前翅浅褐色，后者基线、内线黑色，肾纹模糊，中线粗，黑色，外线暗褐色，亚端线带状，暗褐色；后翅赭白色，基部带有黑色并延伸至黑色横脉纹，端带黑色，翅外缘近中部一浅黄曲纹；腹部黑色；雌蛾前翅可见环纹呈黑色。

分布 四川。

### 苇实夜蛾 *Heliothis maritima* Graslin (图版 VII-7)

*Heliothis maritima* Graslin, 1855, Ann. Soc. ent. Fr. 3: 68, pl. 7, figs. 1—7. (法国)

*Chloridea maritima*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 40 as a syn. of dipsacea Linnaeus. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 197, pl. 22h.

*Melicleptria maritima*: Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 686.

翅展 25—38 mm。头、胸灰褐带霉绿色；前翅霉灰色，内线黑色锯齿形，环纹由三个黑点组成，三角形，肾纹黑棕色，后端越出中室，外围黑色三角形点，中带红褐色，外线锯齿形，黑色，亚端线在各翅脉间现黑点，线内侧带褐色，前端似三角形；后翅赭黄，前、后缘区及亚中褶内半黑色，横脉纹巨大，端带黑色；腹部灰褐色。

寄主 芦苇、拟漆姑属植物的花 (据 Forster)。

分布 河北；日本，欧洲。

### 实夜蛾 *Heliothis viriplaca* (Hufnagel) (图版 VII-8)

*Phalaena viriplaca* Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3 (4): 406. (德国)

*Phalaena dipsacea* Linnaeus, 1767, Syst. Nat. 12: 856.

*Chloridea dipsacea*: Hampson, 1903, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 4: 40.