

喙发达，下唇须斜向前伸，很短，额光滑无突起，雄蛾触角线形，头部与胸部被毛和毛状鳞，前、后胸有散开型毛簇，足胫节饰毛；腹部仅基节背面有毛簇；前翅宽、有副室；后翅6、7脉共柄，5脉微弱，自中室横脉中下部发出。

贺夜蛾 *Heraema mandschurica* (Graeser) (图版XXXII-9)

Pachnobia mandschurica Graeser, (1890) 1889, Berl. ent. Zeit. p. 256. (SE Siberica: Raddefka)

Heraema mandschurica: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 429. —Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 180. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 263. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.984.

翅展36mm。头部与胸部红褐色，颈板端部及翅基片褐黄色，下胸与足深褐色；前翅红褐色带有灰色，中区后半部、外区前部及端区深褐色，基线黑棕色，波浪形，自前缘脉至1脉，内线黑棕色，不规则锯齿形，外斜，在1脉处齿较大，外侧在亚中褶处有一黑棕色楔形大斑伸至外线，剑纹、环纹及肾纹均无明显轮廓，中线在中室前为一明显黑棕色斜条，在2、3脉基部与外线相合，外线双线黑棕色，锯齿形，4脉后内斜，外区前缘脉上有一列白点，亚端线黑棕色，外侧色暗，在前缘区有一白纹，端线黑褐色，缘毛褐色；后翅褐色，端区色较暗，外线较粗，暗褐色，缘毛黄白色，中有一褐线；腹部黄褐色。

分布 黑龙江、内蒙古、辽宁、湖北；俄罗斯。

袭夜蛾属 *Sidemia* Staudinger

Sidemia Staudinger, 1892, Mem. Lep. 6: 459.

Type-species: *Sidemia snelleni* Staudinger.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达到额中部，前方有毛，额平滑，复眼大而圆，头部和胸部是毛和毛状鳞；前胸及后胸有散开的毛簇，胫节微有毛；腹部只基节有毛簇；前翅顶角钝，外缘弧曲，呈波浪形。

种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 克袭夜蛾 *Sidemia spilogramma*
雄蛾触角线形 袭夜蛾 *S. bremeri*

袭夜蛾 *Sidemia bremeri* (Erschov) (图版XXXII-10)

Agrotis bremeri Erschov, 1870, Trud. ross. ent. Obs. 4: 152. (西伯利亚)

Noctua speciosa Bremer, 1861, Lep. Ost. -Sib. p. 50.