

暗缘长须夜蛾 *Herminia innocens* Butler (图版 LXVIII-39)

Herminia innocens Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 63, pl. 56, fig. 10. (日本横滨)

Herminia lineosa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 193.

Zanclognatha undulata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 193.

Zanclognatha innocens: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 418, pl. 74h. —Draeseke, 1931, Dt. ent. Z. Iris, 45: 77. —Inoue et Sugi, 1958, Check List Het. Jap. 5: 608. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 151.

Herminia innocens: Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 930, pl. 226, figs. 32, 33.

翅展 23mm 左右。头部与胸部淡黄褐色，下唇须外侧褐色杂少许黄灰色，足跗节外侧黑褐色；前翅灰褐色，前缘与外缘色较暗，内线黑褐色，前半外弯，在中室后内弯，外线深褐色，前半微外弯，但在中褶处微内弯，在 4 脉后内弯，亚端线黑褐色，较直，在 3—4 脉间稍外凸，端线黑褐色，内、外线间在中褶后有一深褐色带，缘毛灰色杂黑褐色；后翅淡赭黄色，外线深褐色，外弯，亚端线在 6 脉后可见，深褐色，在 2 脉近端部折角内斜，端线深褐色，缘毛淡赭黄色，中部杂褐色；腹部灰褐色，各节间黄白色。

分布 江苏；朝鲜，日本，印度。

窄肾长须夜蛾 *Herminia satakei* Owada (图版 LXVIII-40)

Herminia satakei Owada, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 931, pl. 226, figs. 39, 40; pl. 390, figs. 4—6 male genitalia. (日本)

Herminia satakei: Owada, 1987, A taxonomic study on the Subfamily Herminiinae of Japan, p. 130, figs.

翅展 23 mm。头部与胸部浅赭黄色微带褐色，雄蛾触角线形，下唇须向上弯，似镰刀状，远超过头顶；前翅浅赭黄色微带褐色，内线褐色，波浪形外弯，中线褐色，粗而模糊，自肾纹后波曲内斜，肾纹细窄，褐色折曲，外线褐色，波曲外弯，在中褶处稍内凹，4 脉后内弯，亚中褶后较直，亚端线褐色，较粗，自前缘脉近顶角微曲内斜，在 5 脉处稍外凸，其后内弯，端线由一系列黑褐点组成；后翅赭白色，隐约可见褐色横脉纹，外线褐色，内斜，亚端线褐色，在中褶之前不明显，在亚中褶处折角内斜并微弱，端线黑褐色；腹部浅赭黄色。

分布 江西；日本。

赭黄长须夜蛾 *Herminia arenosa* Butler (图版 LXVIII-41)

Herminia arenosa Butler, 1878, Ill. Het. Colln Br. Mus. 2: 56, pl. 38, fig. 8. (日本横滨)

Zanclognatha tarsicrinalis: Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 562.

Zanclognatha tarsicrinalis var. *arenosa*: Staudinger et Rebel, 1901, Cat. Lep. pal. Faun. 1:254.