

色，在前缘区及亚中褶处呈黑色，在前缘与中室间外突，1脉后外斜，中线仅在前缘脉处现一衬红的黑点，外线浅枣红色衬土黄色，双线，亚端线褐色波曲，端线只现一列黑点，端区色较浅，剑纹黑色，较短，枣红色边，环纹黑色，灰黄边，近三角形，肾纹小，黑色，枣红色边，近“V”形；后翅灰白色，横脉纹及外线褐色；腹部灰黄色。雄蛾抱钩近瓣端（图165）。

分布 云南、西藏。

星狭翅夜蛾 *Hermonassa planeta* Chen (图版XI-32)

Hermonassa planeta Chen, 1993, Sinozool. 10: 364, fig. 2. (云南维西)



图166 星狭翅夜蛾 *Hermonassa planeta* Chen ♂ 外生殖器

翅展30mm。头部与胸部褐色，颈板近中部有一黑弧纹，其上方杂有红棕色，下方杂有黄白色；前翅污褐色，端区褐灰色，基线双线黑色，自前缘脉内斜至1脉，内线双线黑色，粗而间断，剑纹短，黑色，浅褐边，环纹与肾纹较小，环纹内端尖，黑色一浅褐边，肾纹窄，黑色，浅褐边，外线双线黑色，波浪形，亚端线黑色，波浪形，前端为一黑三角斑，翅外缘有一列黑点；后翅白色微带黑色，半透明；腹部褐色。


雄性外生殖器的钩形突细长，抱器瓣端部尖，抱钩长弯，伸出瓣腹缘，阳茎短粗，内囊有一乳头状角状器（图166）。

分布 云南。

缘狭翅夜蛾 *Hermonassa megaspila* Boursin (图版XI-33)

Hermonassa megaspila Boursin, 1967, Z. Wien. ent. Ges. 52: 28, pl. 1, fig. 11; pl. 6, fig.

9. (陕西太白山)

图 167 缘狭翅夜蛾 *Hermonassa megapila*

Boursin ♂ 外生殖器

翅展 31mm。头部褐色，头顶杂黑色；胸部灰黑色，颈板基部有黑色横条，端部杂白色，下胸褐色，足杂有白色及黑色，腿节与胫节间有明显黑斑；前翅灰黑色，基线双线黑色，粗，自前缘脉近呈直线内斜，线间白色，剑纹大，萝卜形，尖端向内，黑色白边，内线双线黑色，微外弯，线间白色，穿过剑纹，中室前、后缘部分带黄白色，内线内侧的中室有一内斜黄白线，环纹巨大，扁圆形，但内、外端尖，外端伸达肾纹，黑色，黄白边，肾纹大，色似环纹，外线双线黑色，细锯齿形，外弯，3脉后内弯，线间浅褐色，亚端线由一系列赭黄色新月形斑组成，内侧有一列黑褐纹，位于5脉前，在前缘区似一砧形斑，翅外缘有一列扁三角形黑纹；后翅污灰色；腹部褐色。

雄蛾抱器瓣腹缘波曲，端缘斜，阳茎粗长有2粗角状器（图167）。

分布 陕西、四川。

罗狭翅夜蛾 *Hermonassa roesleri* Boursin (图版 XI-34)

Hermonassa roesleri Boursin, 1967, Z. Wien. ent. Ges. 52: 32, pl. 2, fig. 22; pl. 8, fig. 18. (云南丽江)

Hermonassa roesleri: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.99.

翅展 28mm。头部灰褐色；胸部灰黑色；前翅褐色杂有灰色，基线黑色，双线内斜，内线双线黑色，前半直，后半折曲，剑纹黑褐色，较粗，外围色浅，环纹与肾纹黑褐色，后者中有一淡纹，中线黑褐色波曲，外线双线黑色，波浪形内斜，亚端线褐色波曲，端线褐色，由新月形点组成；后翅灰白色，外缘褐色；腹部黄褐色。

雄蛾抱器瓣很窄，抱钩很长，阳茎肥大，有一粗角状器（图168）。

分布 云南、西藏。