

分布：陕西、甘肃、上海、浙江、湖南、四川、云南；日本，朝鲜，俄罗斯。

台湾奇带尺蛾 *Heterothera sororcula* (Bastelberger, 1909) comb. nov.

Thera sororcula Bastelberger, 1909, Ent. Z. 23: 34. (台湾：阿里山)

前翅较宽阔，灰黄褐色；亚基线和内线形成一条浅弧形灰黑色带；中带灰黑色，形状近似前种，但较狭窄，外线中上部凸出较少。后翅淡灰褐色。

未见标本。


分布：台湾。

备考：据 Prout (1941)，本种最接近奇带尺蛾，故移入此属。


俄带尺蛾属 *Viidaleppia* Inoue, 1982

Viidaleppia Inoue, 1982, Moths Japan 1: 489.

模式种：*Cidaria quadrifulta* Prout, 1928 (日本)



903



904

图 903—904 903. 疑俄带尺蛾 *Viidaleppia incerta* Inoue, ♂ 触角；
904. 锯俄带尺蛾 *V. serrataria* (Prout), ♀ 翅脉

近似黑带尺蛾属 *Thera* Stephens 和奇带尺蛾属 *Heterothera* Inoue。但♂触角羽状，每节两对细长栉齿（图 903）。前翅径副室 1—2 个。后翅中室端脉为强烈双折角（图