

分布 湖南、福建、江西、广西、四川。

陵夜蛾属 *Hoplotarache* Hampson

Hoplotarache Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 712.

Type-species: *Tarache minoides* Hampson.

喙发达，下唇须斜向上伸，额有平截椎形突起，边缘隆脊形，中央一圆突，复眼大，触角线形稍扁；胸部主要被鳞片；前翅有一副室，后翅5脉发达，自中室下角稍前发出，3、4脉自中室下角发出，或共一短柄。

种 检 索 表

前翅前缘区大部白色..... 白缘陵夜蛾 *Hoplotarache binominata*
前翅前缘区大部及后缘区内半白色..... 蒙陵夜蛾 *H. deceptrix*

蒙陵夜蛾 *Hoplotarache deceptrix* Warren (图版XLII-2)

Hoplotarache deceptrix Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 299, pl. 27a. (印度)

Hoplotarache deceptrix: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 333.

翅展 26 mm 左右。头部及胸部乳白色；前翅乳白色，基线为两排褐灰斑组成，内线褐灰色，间断，环纹灰色圆形，肾纹灰色，外围稍黑，中线在前缘区为一黑褐色斜三角形斑，在中室后半为褶纹，其后为黑灰色三角形大斑，与外线融合，肾纹前方的前缘脉上有一黑褐斑，外线双线白色，线间及外侧褐色带暗绿色，锯齿形内斜，在1脉上成较尖齿，亚端线黄白色波浪形，端线为一列黑点，缘毛黄白色，顶角、臀角及5、6脉端各一黑斑；后翅乳白色，端区黑褐色。

分布 广西、云南；印度。

白缘陵夜蛾 *Hoplotarache binominata* (Butler) (图版XLII-3)

Tarache binominata Butler, 1892, Entom. 25: 64. (印度)

Acontia costalis Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 33: 784.

Hoplotarache binocostalis ssp. *inquinata* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 299.

Tarache binominata: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 313.

Hoplotarache costalis: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 10: 714, pl. 170, fig. 27.

翅展 20 mm。头部与颈板白色微带褐色，下唇须浅褐色；胸部背面褐色，下胸与足白色，前足胫节有白斑；前翅褐色，布有灰色细点，前缘区白色，其后缘达中室，外端达亚端线，白色区内带有褐色，内线细弱，褐色，微曲外斜，中室及中室横脉外侧各有一小白斑与白色区相连，外线细弱，褐色，自白色区后行，4脉后内弯，亚端线褐