



图 1177—1178 雄性外生殖器. 1177. 俭界尺蠖 *Horisme parcata* (Püngeler);
1178. 中国真界尺蠖 *H. tersata chinensis* (Leech)

真界尺蠖 *Horisme tersata* ([Denis et Schiffermüller], 1775)

Geometra tersata [Denis et Schiffermüller], 1775, Ankündigung syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 109. (欧洲)

Horisme tersata: Hübner, [1825] 1816, Verz. bekannter Schmett.: 331.

Phibalapteryx tersata: Stephens, 1831, Illust. Br. Ent. (Haustellata) 3: 256.

Eucymatoge tersata: Meyrick, 1892, Trans. ent. Soc. Lond. 1892: 68.

寄主植物: 女萎。

分布: 中国, 日本, 俄罗斯, 欧洲。

下述亚种在中国广泛分布。

中国亚种 *subsp. chinensis* (Leech, 1897) (图版 XXIV: 32)

Phibalapteryx tersata var. *chinensis* Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 19: 561. (湖北: 长阳)

Horisme tersata chinensis: Prout, 1915, in Seitz, Macrolepid. World 4: 301.

前翅长: ♂ 14—17 mm, ♀ 17—18 mm。头和胸部灰黄色至灰褐色, 下唇须、额下缘和头顶前缘黑褐色, 中线前端有一黑褐色横带, 腹部背面灰褐色第一腹节后缘黑褐色, 第二至第六腹节立毛簇为清晰黑点。翅型同维界尺蠖。前翅灰黄色至灰黄褐色, 前缘下方颜色略浅, 形成不明显的浅色纵带; 线纹和中点近似四川维界尺蠖, 但不如该亚