

19—Ⅶ. 11。

分布：新疆；中亚地区。

四川亚种 subsp. *ponderata* Prout, 1938 (图版 XXIV: 30)

Horisme vitalbata ponderata Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 213. (四川：打箭炉)

前翅长：♂ ♀ 16—17 mm。体型和颜色介于上述两个亚种之间。两翅中点弱小但存在；前翅斑纹清晰但不如阿穆尔亚种浓重，中线和外线常穿过浅色纵带伸达前缘；后翅端部深色纹在顶角附近仍依稀可辨。

雄性外生殖器（图 1176）：囊形突延长近半圆形。抱器腹强烈弯曲，端突分为二岔，抱器瓣端部较圆，无骨片。阴茎中等大小，阴茎盲囊不展宽，角状器为一支大刺，其长度大于阴茎直径。

雌性外生殖器（图 1181）：囊导管特别粗大，其中具三条骨化带，带上生大刺。囊颈处具大刺，囊体圆形，密布花刺。

检视标本：1 ♂，青海祁连，1977. Ⅶ. 31；3 ♂ 4 ♀，西藏江达，3 400 m，1976. 7. 24—31。

分布：甘肃、青海、四川、西藏。

俭界尺蛾 *Horisme parcata* (Püngeler, 1908) (图版 XXIV: 31)

Phibalapteryx parcata Püngeler, 1908, Dt. ent. Z. Iris 21: 301. (青海：库库诺尔)

Horisme parcata: Prout, 1915, in Seitz, Macrolepid. World 4: 301.

前翅长：♂ ♀ 15 mm。额和下唇须黑褐色，额上半部掺杂白鳞，下唇须较短粗。胸腹部背面灰褐色，中胸前端和第一腹节黑褐色。翅较宽阔。前翅灰褐色，前缘至中室下缘和 M_3 处带灰黄色调，斑纹极弱；基半部斑纹几乎完全消失，外线隐约可辨，顶角处的斜线十分细弱，伸达外线；中点深褐色，弱小模糊；亚缘线在 Cu_1 以上为一列白点，在 Cu_1 以下为一段向内凸出的“<”形白线，齿尖处增粗形成白点；缘毛灰褐色掺杂灰白色。后翅污白色，中部以下散布灰褐色，排列模糊深色线纹，外线及其外侧由浅色双线组成的带均模糊；深灰色中点极弱小；翅端部色较深，白色亚缘线下半段清晰。翅反面浅灰褐色至灰褐色，前翅前缘附近带灰黄色调，两翅中点深褐色。

雄性外生殖器（图 1177）：阴茎基环侧突腹面有一对极强骨化的骨片，具齿。囊形突较短。抱器腹弯曲，具短粗端突，抱器瓣端半部较狭长。阴茎短小，无角状器，阴茎盲囊极展宽，呈短钝叉状。

检视标本：1 ♂ 1 ♀，甘肃永登连城林场，1988. Ⅵ. 13。

分布：甘肃、青海。