

悦木夜蛾 *Hulodes hilaris* Prout (图版LVI-10)

Hulodes hilaris Prout, 1921, Ann. Mag. nat. Hist, 9, 8: 27, pl. 4, fig. 3. (N. Guinea)

翅展 66 mm。头部与颈板灰褐色，触角基节有黑斑，下须唇第一节外侧基半部黑色；胸部背面浅褐灰色，前足与中足胫节基部有黑斑；前翅浅褐灰色，布有零星黑点，基线黑色，波曲外弯，在前缘脉上不显，内线黑色，在前缘区为粗点状，其后微弱，自中室后微曲内斜，至 1 脉成一内突齿，中线仅在前缘区现一黑斜纹，外线黑色，自前缘脉后至 5 脉为不规则波浪形，5 脉后微波浪形强内斜，亚端线双线黑色，自顶角微曲内斜，内一线粗，外线与亚端线之间有多条波浪形黑线，端区各翅脉间有一灰白纵线，近翅外缘有一列黑点，缘毛基部有一灰白线；后翅浅褐灰色，近中部有一粗黑线，较直内斜，外区有三条由模糊暗褐点组成的细波浪形线，稍外弯，亚端线双线，内一线粗而黑，外一线弱，褐色，近翅外缘有一列黑点，翅外缘中部稍外突，臀角处微凹，缘毛基部有一灰白线；腹部浅灰褐色。

分布 云南；巴布亚新几内亚。

木夜蛾 *Hulodes caranea* (Cramer) (图版LVI-11)

Phalaena Noctua caranea Cramer, 1780, Uitl. Kapell. 3: 140, pl. 269, figs. e, f. (爪哇)

Hulodes caranea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 363. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 107. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

翅展 73 mm。全体灰褐色。雄蛾前翅端区灰色，内线、中线及外线黑色波浪形，肾纹仅现灰色边缘，外线在 8 脉折角内斜达后缘近中部，亚端线自顶角内斜，7 脉后为直线，线内侧大部暗褐色，端线黑色，内侧一列黑点。雌蛾前翅亚端线双线黑色，内一线内侧衬较宽黑褐色，后翅亚端线双线，内一线内侧模糊褐色。

寄主 老鸦企属。

分布 湖南、广东、海南、广西、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚。

荣夜蛾属 *Gloriana* Kirby

Gloriana Kirby, 1897, Handb. Order Lep. 5: 168.

Type-species: *Phyllodes ornata* Moore.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节宽，达头顶，第三节长，触角线形；胸部被平滑鳞片，腹部被长毛；前翅前缘强拱曲，顶角稍尖，臀角处弧曲；后翅基部有长毛；腹部稍长。

种 检 索 表

后翅外区一橘红色锯齿形线 锯线荣夜蛾 *Gloriana dentilinea*