

1. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.365, pl. 25, fig. 10.

翅展 30 mm。头部与胸部褐色带灰色，雄蛾触角线形，有鬃毛，下唇须向上弯，似镰刀状，远超过头顶；前翅暗褐色，肾纹黑褐色，细窄，外线赭白色，不规则波浪形外弯，在中褶处内凹，在 3 脉后强内弯，亚端线赭白色，不规则细锯齿形，自前缘脉后外斜至 7 脉，折向后，端线黑褐色；雌蛾内线黑褐色，波浪形，其内方亦黑褐色，外线双线，黑褐色，线外方亦黑褐色，亚端线赭白色，不规则锯齿形，内线与外线之间赭黄色；后翅褐灰色，隐约可见黑褐色横脉纹，端线黑褐色；腹部褐灰色。

幼虫食枯叶。

分布 黑龙江、浙江、西藏；日本，西伯利亚。

荚翅亥夜蛾 *Hydrillodes abavalis* (Walker) (图版 LXVII-36)

Echana abavalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 196. (斯里兰卡；沙捞越)

Echana abavalis: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 241.

Hydrillodes abavalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 55, fig. 27. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 381. —Chen, *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.366, pl. 25, fig. 11.

翅展 29 mm。头部褐色，下胸须扁长，向上弯似镰刀状，超过头顶，暗灰褐色，第三节端部尖；胸部褐色，足外侧暗褐色；前翅褐色，雄蛾前缘区中部有一近半圆形褶片，其上有细毛鳞，前缘脉在褶片的内端凹曲，横线及斑纹不显；后翅淡褐色；腹部褐色。

分布 海南、云南、西藏；印度，斯里兰卡，印度尼西亚，马来西亚。

弓须亥夜蛾 *Hydrillodes repugnalis* (Walker) (图版 LXVII-37)

Hypochalcia repugnalis Walker, 1863, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 27: 47. (Sarawak)

Bocana basalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 88.

Bleptina morosa Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. p. 64.

Rhynchina morosa: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 650.

Hydrillodes morosa: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 54. —Warren, 1913, *in* Seitz, Macrolep. World 3: 426, pl. 72h. —Ogata, 1958, *in* Esaki, Icon. Het. jap. p. 196. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 380.

Hydrillodes repugnalis: Owada, 1982, *in* Inoue, Moths Jap. 1: 915, pl. 224, figs. 11—16. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.365.

翅展 19 mm。头部褐色，下唇须长而弯，第二节向上弯超过头顶，第三节细长，雄蛾饰有长鳞片，触角线形，有细短毛；胸部褐色，足暗褐色，跗节有褐白斑；前翅淡褐色，基部及外线外方色较深，内线褐色波曲，环纹只现一黑点，肾纹为一黑色小曲

条，中线褐色，波浪形，外线褐色，不规则波浪形外弯，在亚中褶处内凸，亚端线隐约可见，不规则波曲；后翅淡灰褐色，可见深褐色短小的横脉纹；外线深褐色；腹部褐色。

寄主 化香的枯叶。

分布 山东、湖南、台湾、福建、广东、广西、西藏；日本，印度，斯里兰卡，东南亚。

尖须夜蛾属 *Bleptina* Guenée

Bleptina Guenée, 1854, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 8: 66.

Type-species: *Bleptina caradrinalis* Guenée.

Opotura Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 191.

Anagoa Moschler, 1886, Abh. senck. natur. Ges. 14 (3): 62.

喙发达，下唇须镰刀形，第二节超过头顶，第三节尖而长，后缘有毛簇，雄蛾触角有短纤毛丛；胸、腹部鳞片平滑；前翅顶角稍尖，有副室；前足胫节下缘常有一鞘，内有成块的鳞丛。

种 检 索 表

1. 前翅中、外、亚端线近直线 白线尖须夜蛾 *Bleptina albolinealis*
前翅各横线非全直线 2
2. 前翅内线、外线白色，近呈直线 3
前翅内线、外线黑色 伸尖须夜蛾 *B. propugnata*
3. 前翅 2、3 脉基半部白色 四叉尖须夜蛾 *B. ambigua*
前翅 2、3 脉基半部非白色 4
4. 前翅中脉白色 白纹尖须夜蛾 *B. albovenata*
前翅中脉非白色 5
5. 前翅内线在中室前折角 脉尖须夜蛾 *B. venata*
前翅内线直 并线尖须夜蛾 *B. pararella*

白线尖须夜蛾 *Bleptina albolinealis* Leech (图版 LXVII-38)

Bleptina albolinealis Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 627. (九江)

Bleptina albolinealis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 425, pl. 75a. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 383. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.370. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1037,