

- 前翅粉绿色 2
2. 前翅内、外线及亚端线平行 丽粉翠夜蛾 *H. elegans*
前翅内、外线不平行 3
3. 后翅雄白色, 雌黄色 太平粉翠夜蛾 *H. tsukusensis*
后翅雄白色带有青色 粉翠夜蛾 *H. orientalis*

川粉翠夜蛾 *Hylophilodes buddhae* (Alpheraky) (图版 XXXVIII - 35)

Hylophila buddhae Alpheraky, 1897, Mem. Lep. 9: 132, pl. 9, fig. 8. (四川: Da-bo-sian)

Hylophila buddhae: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 672. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 297, pl. 75g.

翅展 37 mm。头部褐色, 杂有少许白色, 头顶嫩绿色, 下唇须白色微带褐色; 胸部背面嫩绿色, 颈板端部白色, 下胸褐白色, 前足胫节外侧褐色; 前翅嫩绿色, 前缘脉白色, 后缘区白色, 基部白色宽, 达亚中褶, 向外渐窄, 一白色内斜线自亚端区前缘脉至翅后缘近中部, 翅外缘毛白色, 基部有一波浪形棕色线, 在各翅脉端的棕线伸至缘毛端部, 后缘毛白色; 后翅白色; 腹部白色, 背面带褐灰色。

分布 四川。

丽粉翠夜蛾 *Hylophilodes elegans* Draudt (图版 XXXVIII - 36)

Hylophilodes elegans Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 146, pl. 9, fig. 4. (云南丽江)

Hylophilodes elegans: Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1019.

翅展 30 mm。头部暗绿色, 触角及下唇须外侧浅褐色; 胸部背面嫩绿色, 颈板基部白色, 下胸白色, 足外侧浅褐色; 前翅粉绿色, 前缘白色, 肾纹只现一黑点于横脉前端, 外线白色, 不清晰, 自前缘脉 2/3 处直线内斜至后缘约 2/3 处, 亚端线暗绿色, 与外线近平行, 有间断, 亚端区的前缘脉带有棕红色, 翅外缘毛黄白色杂灰黑色, 基部有一黄白线, 后缘毛除翅基部外均红褐色; 后翅白色; 腹部白色微带褐灰色, 腹面杂有灰黑色鳞。

分布 四川、云南。

太平粉翠夜蛾 *Hylophilodes tsukusensis* Nagano (图版 XXXVIII - 37)

Hylophiloides [sic] *tsukusensis* Nagano, 1918, Ins. World Gifu. 22: 192. (日本)

Hylophilodes pacifica Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 207.

Hylophilodes pacifica: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 146. —Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 66.

Hylophilodes tsukusensis: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 800.