

- 前翅粉绿色 2
2. 前翅内、外线及亚端线平行 丽粉翠夜蛾 *H. elegans*
前翅内、外线不平行 3
3. 后翅雄白色, 雌黄色 太平粉翠夜蛾 *H. tsukusensis*
后翅雄白色带有青色 粉翠夜蛾 *H. orientalis*

川粉翠夜蛾 *Hylophilodes buddhae* (Alpheraky) (图版 XXXVIII - 35)

Hylophila buddhae Alpheraky, 1897, Mem. Lep. 9: 132, pl. 9, fig. 8. (四川: Da-bo-sian)

Hylophila buddhae: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 672. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 297, pl. 75g.

翅展 37 mm。头部褐色, 杂有少许白色, 头顶嫩绿色, 下唇须白色微带褐色; 胸部背面嫩绿色, 颈板端部白色, 下胸褐白色, 前足胫节外侧褐色; 前翅嫩绿色, 前缘脉白色, 后缘区白色, 基部白色宽, 达亚中褶, 向外渐窄, 一白色内斜线自亚端区前缘脉至翅后缘近中部, 翅外缘毛白色, 基部有一波浪形棕色线, 在各翅脉端的棕线伸至缘毛端部, 后缘毛白色; 后翅白色; 腹部白色, 背面带褐灰色。

分布 四川。

丽粉翠夜蛾 *Hylophilodes elegans* Draudt (图版 XXXVIII - 36)

Hylophilodes elegans Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 146, pl. 9, fig. 4. (云南丽江)

Hylophilodes elegans: Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1019.

翅展 30 mm。头部暗绿色, 触角及下唇须外侧浅褐色; 胸部背面嫩绿色, 颈板基部白色, 下胸白色, 足外侧浅褐色; 前翅粉绿色, 前缘白色, 肾纹只现一黑点于横脉前端, 外线白色, 不清晰, 自前缘脉 2/3 处直线内斜至后缘约 2/3 处, 亚端线暗绿色, 与外线近平行, 有间断, 亚端区的前缘脉带有棕红色, 翅外缘毛黄白色杂灰黑色, 基部有一黄白线, 后缘毛除翅基部外均红褐色; 后翅白色; 腹部白色微带褐灰色, 腹面杂有灰黑色鳞。

分布 四川、云南。

太平粉翠夜蛾 *Hylophilodes tsukusensis* Nagano (图版 XXXVIII - 37)

Hylophiloides [sic] *tsukusensis* Nagano, 1918, Ins. World Gifu. 22: 192. (日本)

Hylophilodes pacifica Mell, 1943, Zool. Jb. 76: 207.

Hylophilodes pacifica: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 146. —Chu et al., 1964, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 2: 66.

Hylophilodes tsukusensis: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 800.

翅展 24—34 mm。头部黄绿色，额白色，触角红褐色，下唇须红棕色杂有白色；胸部绿色，翅基片端部白色，胸背面中央有黄色纵带，两侧白色，后胸具黄毛，足红棕色，后足胫节白色；前翅黄绿色，内线直，中央黄色，内侧衬绿色，外侧衬白色，稍内斜，外线中央黄色，内侧衬白色，外侧衬绿色，自前缘脉近顶角处近直线内斜至翅后缘中部，亚端线绿色，三曲形，翅前缘带有黄色，端部红色，翅后缘区带有黄色，外缘毛红棕色；后翅白色。雄蛾前翅可见暗绿色横脉纹，后翅除前缘区外，大部带有浅赭色及淡绿色；腹部白色，基部及背面有黄毛，腹面白色。

分布 浙江；日本。

粉翠夜蛾 *Hylophilodes orientalis* (Hampson) (图版 XXXVIII - 38)

Halias orientalis Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 132, fig. 87. (印度那加山)

Hylophilodes parallela Warren, 1916, Nov. zool. 23: 222.

Hylophilodes orientalis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 510. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 424. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 146. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321. —Chen, 1992, in Peng, Icon. Eor. Ins. Hunan p. 993.

翅展 35 mm 左右。头部及胸部绿色，颈板基部及后胸带白色，下唇须、额及触角褐色，下胸与足白色；前翅绿色，前缘黄褐色，内线黄色，内侧跗绿，内侧衬白，较直内斜，中室端部一绿色窄纹，外线黄色，内侧跗白，外侧衬绿，直线内斜、亚端线绿色，大锯齿形，缘毛棕红色；后翅白色，除前缘外均带绿色，后缘区黄色。雌蛾前翅缘毛黄色；后翅白色；腹部背面黄绿色。

分布 浙江、福建、四川；印度。

饰夜蛾属 *Pseudoips* Hübner

Pseudoips Hübner, 1822, Syst. -alphab. Verz. p. 59, 63.

Type-species: *Pseudoips prasinana* Linnaeus.

Hylophila Hübner, 1825, 1816, Verz. bek. Schmett. p. 396.

Chloephora Stephens, 1827, in Anonumous Retr. Rev. 2, 1: 242.

Halias Treitschke, 1829, Schmett. Eur. 7: 227.

Chloephila Constantini, 1920, Atti Soc. nat. Mat. 5, 5: 4.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节约达头顶，前缘饰毛，第三节长，额光滑无突起，复眼圆大；胸部被毛，无毛簇；腹部背面无毛簇；前翅顶角稍尖，外缘内斜，较直；后翅 3、4 脉或共一短柄，5 脉发达，自中室下角稍上方伸出。