

Moths Jap. 1: 908, pl. 222, fig. 33.

翅展 27 mm。头部、胸部与前翅暗紫灰色；前翅内半黑褐色，以一近直线的中线为界，线外侧色较白，亚端线不清晰；后翅灰褐色；腹部褐色。

分布 江西；日本。

### 飒髯须夜蛾 *Hypena litterata* (Pagenstecher) (图版 LXVI-15)

*Plusia litterata* Pagenstecher, 1888, Jahr. Nass. Ver. Nat. 41: 137. (印度尼西亚)

*Hypena biplagiata* Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 86.

*Athyrma aurotincta* Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 23, pl. 163, fig. 10.

*Sarobela spectabilis* Turner, 1936, Proc. roy. Soc. Qd. 47: 44.

*Hypena biplagiata*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 90.

翅展 26 mm。头部与胸部浅褐色带灰色；前翅底色灰褐，内线与中线之间有一黑褐斑，自前缘脉外斜达 1 脉，其内缘直，外缘波曲，外线至顶角之间有一近三角形黑褐色大斑，其内缘波曲，亚端线极细，黑褐色，微曲内斜；后翅浅褐色，端区色暗；腹部暗褐色，基部带灰色。

分布 海南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚，澳大利亚。

### 紫灰髯须夜蛾 *Hypena incisa* Leech (图版 LXVI-16)

*Hypena incisa* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 655. (中国西部: Wa-shan)

*Hypena incisa*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 436, pl. 75c.

翅展 30 mm。头部与胸部深褐色；前翅紫灰色，密布褐色细点，内线与外线之间在中脉后黑褐色，约呈三角形大斑，其内缘在 1 脉处稍内凸成齿，其后凹曲，其外缘在 2—3 脉间微曲，环纹只现一黑褐点，肾纹隐约可见，位于外线前半内侧的黑褐影中，外线灰白色，自前缘脉内弯，在 5 脉处明显成一外凸齿，线外侧有一与之平行的细褐线，亚端线暗褐色，曲度与外线相似，外侧前段杂白色，外线与亚端线间有一黑褐粗线，曲度亦相似，此线与亚端线间带有褐色，尤其前段更浓，一黑褐纹自顶角后内斜至亚端线折曲处，其后有一黑棒纹及一黑短线，端线黑褐色；后翅褐色；腹部暗灰褐色，背毛簇黑褐色。

分布 广西、四川、云南；缅甸，锡金。

### 窄带髯须夜蛾 *Hypena occatus* Moore (图版 LXVI-17)

*Hypena occatus* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 191. (印度)

*Hypena hampsonialis* Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 261.

*Hypena occatus*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 90. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 654. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 434, pl. 73e. —Sugi, 1982, in