

中部与外线相合，环纹为一黑点，外线黄白色，内侧衬褐色，二曲内斜，后端与内线合，内线、外线间为一暗褐色区，亚端线隐约可见黄白色，微呈锯齿形，后半内方带有黄白色，顶角有一黄白色内斜曲纹，其内侧色黑，端线黑色，缘毛基部黄白色；后翅暗褐色，端线黑色。

**分布** 云南；印度。

### 清髯须夜蛾 *Hypena indicatalis* Walker (图版 LXVI-33)

*Hypena indicatalis* Walker, 1859 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 61. (沙撈越)

*Hypena tortuosa* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 188.

*Hypena persimilis* Hampson, 1891, Ill. Het. Colln Br. Mus. 8: 94.

*Hypena caliginosa* Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 262.

*Hypena indicatalis*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 89. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 908.

*Bomolocha indicatalis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 434. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 153.

翅展 25 mm 左右。头部与胸部暗褐色杂少许灰色，足跗节黑褐色，各节端部有灰白斑；前翅灰色杂褐色，外线以内区域带紫褐色，基线仅在前缘区现一黑点，内线微黑，锯齿形，中室后不明显，环纹为一黑点，肾纹黑色，外线黑色，外侧衬白色，内斜，在 2 脉与 5 脉处各成一外凸齿，亚端线呈一暗褐色带，前端约呈三角形，中有二黑短纹，在 6 脉处中断其后宽而外展，外端近达顶角，后半渐窄，端线黑褐色，在各翅脉端部为黑点，缘毛黑褐色，有二白色波浪形线；后翅淡褐色，端线黑色，缘毛似前翅；腹部褐黄色。

**寄主** 苎麻。

**分布** 湖南、福建、海南、广西；日本，朝鲜，印度，马来西亚。

### 细纹髯须夜蛾 *Hypena undistrigata* Joannis (图版 LXVI-34)

*Hypena undistrigata* Joannis, 1929, Ann. Soc. ent. Fr. 98: 408, pl. 1, fig. 17. (越南)

翅展 37 mm。头部与胸部深棕色，额两侧各有一白斑，下唇须第三节端部黄白色，足外侧黑褐色；前翅褐色，布有黑棕色碎纹，内线黑棕色，在前缘区为一外斜长点，自中室前缘微波曲外斜，只至 1 脉，外线黑棕色，自前缘脉至中褶折角内斜至翅后缘中部，前半内侧深棕色似一带，在亚中褶处黑棕色成一纵条伸达内线，亚端线仅在 5 脉前现一列黑色齿形斑纹，其外侧均衬黄色，一黑纹自顶角内斜至亚端线，其后侧暗棕色，似成一三角形斑，缘毛赭黄色间暗褐色，中有二黑棕线；后翅红褐色，缘毛基部有一浅黄线；腹部灰褐色，背面暗褐色。

**分布** 四川；越南。