

部黄灰色，第二节向前平伸，第三节稍向上伸；胸部黄褐色，足外侧褐色杂黑褐色，前足跗节各节间有灰黄色斑；前翅灰褐色，布有黑色细点，内线褐色，波曲外弯，不明显，环纹与肾纹不显或仅现一黑点，外线褐色，近呈直线自前缘脉内斜至翅后缘近中部，亚端线黑色，锯齿形，中部外弯，间断为点列，在1脉后的点大而圆，端线由一系列黑点组成，顶角尖外突，翅外缘中部稍外拱，与顶角尖突之间微凹；后翅暗褐灰色；雄蛾外线外线；腹部灰褐色。

分布 浙江、湖南；日本，朝鲜，印度。

褐纹髯须夜蛾 *Hypena innocuoides* Poole (图版 LXVI-30)

Hypena innocuoides Poole, 1989, Lep. Cat. Noct. 2: 526. (日本)

Hypena innocua Wileman et West, 1930, Entomologist 63: 63. (preoccupied)

Hypena innocua: Sugi, 1982, in Ionoue, Moths Jap. 1: 907, pl. 222, figs. 1—8; pl. 357, figs. 4, 5.

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色；前翅浅褐色，各横线及斑纹模糊不清，只现散乱的暗褐纹，亚端区可见几个较明显的黑褐斑位于亚中褶、中褶及前缘区；后翅浅灰褐色；腹部褐色。

分布 湖北；日本。

多型种，不同世代的个体色泽亦可有差异。

暗褐髯须夜蛾 *Hypena insolita* Leech (图版 LXVI-31)

Hypena insolita Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 659. (中国西部: Pu-tsu-fong)

Hypena insolita: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 436, pl. 75c.

翅展 29 mm。头部与胸部褐色；前翅暗褐色，基部黑褐色杂紫灰色，内线紫灰色，自前缘脉至中室后缘折向外斜并波曲，外线黑色，自前缘脉微曲内斜至5脉外凸，其后内斜，线前端外侧衬白色，肾纹黑褐色，不清晰，中线黑褐色，模糊，自肾纹后内斜，向后渐扩展，亚端线由一系列黑褐齿形斑组成，其外侧均衬紫灰色，一黑纹自顶角后内斜至6脉，端线黑褐色，波浪形；后翅灰褐色；腹部暗褐色。

分布 四川。

白雾髯须夜蛾 *Hypena lacessalis* Walker (图版 LXVI-32)

Hypena lacessalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 59. (印度)

Hypena lacessalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 84.

翅展 29 mm 左右。头部与胸部褐色杂灰色，下唇须杂少许黑色；前翅灰褐色，内线只在中室前现一外斜黑纹，在中室现一黑点，其后为一黄白色外斜曲条，后端在1脉

中部与外线相合，环纹为一黑点，外线黄白色，内侧衬褐色，二曲内斜，后端与内线合，内线、外线间为一暗褐色区，亚端线隐约可见黄白色，微呈锯齿形，后半内方带有黄白色，顶角有一黄白色内斜曲纹，其内侧色黑，端线黑色，缘毛基部黄白色；后翅暗褐色，端线黑色。

分布 云南；印度。

清髯须夜蛾 *Hypena indicatalis* Walker (图版 LXVI-33)

Hypena indicatalis Walker, 1859 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 61. (沙撈越)

Hypena tortuosa Moore, 1882, Lep. Atk. p. 188.

Hypena persimilis Hampson, 1891, Ill. Het. Colln Br. Mus. 8: 94.

Hypena caliginosa Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 262.

Hypena indicatalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 89. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 908.

Bomolocha indicatalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 434. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 153.

翅展 25 mm 左右。头部与胸部暗褐色杂少许灰色，足跗节黑褐色，各节端部有灰白斑；前翅灰色杂褐色，外线以内区域带紫褐色，基线仅在前缘区现一黑点，内线微黑，锯齿形，中室后不明显，环纹为一黑点，肾纹黑色，外线黑色，外侧衬白色，内斜，在 2 脉与 5 脉处各成一外凸齿，亚端线呈一暗褐色带，前端约呈三角形，中有二黑短纹，在 6 脉处中断其后宽而外展，外端近达顶角，后半渐窄，端线黑褐色，在各翅脉端部为黑点，缘毛黑褐色，有二白色波浪形线；后翅淡褐色，端线黑色，缘毛似前翅；腹部褐黄色。

寄主 苎麻。

分布 湖南、福建、海南、广西；日本，朝鲜，印度，马来西亚。

细纹髯须夜蛾 *Hypena undistrigata* Joannis (图版 LXVI-34)

Hypena undistrigata Joannis, 1929, Ann. Soc. ent. Fr. 98: 408, pl. 1, fig. 17. (越南)

翅展 37 mm。头部与胸部深棕色，额两侧各有一白斑，下唇须第三节端部黄白色，足外侧黑褐色；前翅褐色，布有黑棕色碎纹，内线黑棕色，在前缘区为一外斜长点，自中室前缘微波曲外斜，只至 1 脉，外线黑棕色，自前缘脉至中褶折角内斜至翅后缘中部，前半内侧深棕色似一带，在亚中褶处黑棕色成一纵条伸达内线，亚端线仅在 5 脉前现一列黑色齿形斑纹，其外侧均衬黄色，一黑纹自顶角内斜至亚端线，其后侧暗棕色，似成一三角形斑，缘毛赭黄色间暗褐色，中有二黑棕线；后翅红褐色，缘毛基部有一浅黄线；腹部灰褐色，背面暗褐色。

分布 四川；越南。