

赭黄髯须夜蛾 *Hypena obesalis* Treitschke (图版 LXVI-12)

Hypena obesalis Treitschke, 1829, Schmett. Eur. 7: 27. (德国)

Hypena obesalis: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 659. —Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p.309.

Bomolocha obesalis: Warren, 1913, *in* Seitz, Macrolep. World 3: 434, pl. 73f. —Chu *et al.*, 1963, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 1: 145. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 385. —Chen, 1993. Ins. Hengduan Mts. p.1031.

翅展 32 mm。头部与胸部浅赭黄色杂黑褐色；前翅浅赭黄色，散布黑色及黑褐色纹，内线黑色，大锯齿形，自前缘脉外斜，至 1 脉后极细弱，环纹只现一黑点，由竖立鳞片组成，其后方另有一由黑色竖鳞组成的短斜纹，肾纹窄，微曲，亦由黑色竖鳞组成，外线暗褐色，两侧浅赭色，自前缘脉后波浪形外弯，4 脉后较内弯，2 脉后微弱，亚端线黑褐色，外侧衬浅赭色，波浪形外弯，在各翅脉处间断，顶角内半浅赭黄色，外半黑褐色，翅外缘有一列三角形黑点，5 脉后的点窄扁，缘毛中有二暗褐线，稍间断，端部间有暗褐色；后翅暗褐色，前缘区色浅，端线由一系列黑褐长点组成，缘毛浅赭黄色，中有一模糊褐线；腹部暗褐色，基部背毛簇黑色。

寄主 荨麻。

分布 黑龙江、河北、云南；欧洲。

多型种，雌雄蛾体色亦有异，雌蛾色较暗，斑纹不显。

锈髯须夜蛾 *Hypena lividalis* (Hübner) (图版 LXVI-13)

Pyrallis lividalis Hübner, 1796, Samml. Eur. Schmett. Pyr. pl. 2, figs. 11, 186. (欧洲)

Hypena perna Felder *et* Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 120, fig. 8.

Hypena lividalis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 80. —Warren, 1913, *in* Seitz, Macrolep. World 3: 438, pl. 731, 74a.

翅展 26 mm。头部与胸部锈棕色杂有少许灰色，下唇须下缘及下胸灰白色；前翅锈棕色，有光泽，外线灰白色，近呈直线，自前缘脉内斜至翅后缘中部，在中褶前微呈锯齿形，在前缘区不甚明显，白色向外稍扩散，在 5—8 脉间扩展较宽，5 脉后成稀疏白点，近翅外缘有一列白点，缘毛中有二波浪形白线；后翅灰褐色，缘毛灰白色，中有二波浪形黑褐线。

分布 河北；印度，欧洲，非洲北部。

戏髯须夜蛾 *Hypena furva* Wileman (图版 LXVI-14)

Hypena furva Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. Lond. p. 262. pl. 31, fig. 17. (日本)

Hypena furva: Warren, 1913, *in* Seitz, Macrolep. World 3: 444. —Sugi, 1982, *in* Inoue,