

Moths Jap. 1: 908, pl. 222, fig. 33.

翅展 27 mm。头部、胸部与前翅暗紫灰色；前翅内半黑褐色，以一近直线的中线为界，线外侧色较白，亚端线不清晰；后翅灰褐色；腹部褐色。

分布 江西；日本。

飒髯须夜蛾 *Hypena litterata* (Pagenstecher) (图版 LXVI-15)

Plusia litterata Pagenstecher, 1888, Jahr. Nass. Ver. Nat. 41: 137. (印度尼西亚)

Hypena biplagiata Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 86.

Athyrma aurotincta Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus. 9: 23, pl. 163, fig. 10.

Sarobela spectabilis Turner, 1936, Proc. roy. Soc. Qd. 47: 44.

Hypena biplagiata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 90.

翅展 26 mm。头部与胸部浅褐色带灰色；前翅底色灰褐，内线与中线之间有一黑褐斑，自前缘脉外斜达 1 脉，其内缘直，外缘波曲，外线至顶角之间有一近三角形黑褐色大斑，其内缘波曲，亚端线极细，黑褐色，微曲内斜；后翅浅褐色，端区色暗；腹部暗褐色，基部带灰色。

分布 海南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚，澳大利亚。

紫灰髯须夜蛾 *Hypena incisa* Leech (图版 LXVI-16)

Hypena incisa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 655. (中国西部: Wa-shan)

Hypena incisa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 436, pl. 75c.

翅展 30 mm。头部与胸部深褐色；前翅紫灰色，密布褐色细点，内线与外线之间在中脉后黑褐色，约呈三角形大斑，其内缘在 1 脉处稍内凸成齿，其后凹曲，其外缘在 2—3 脉间微曲，环纹只现一黑褐点，肾纹隐约可见，位于外线前半内侧的黑褐影中，外线灰白色，自前缘脉内弯，在 5 脉处明显成一外凸齿，线外侧有一与之平行的细褐线，亚端线暗褐色，曲度与外线相似，外侧前段杂白色，外线与亚端线间有一黑褐粗线，曲度亦相似，此线与亚端线间带有褐色，尤其前段更浓，一黑褐纹自顶角后内斜至亚端线折曲处，其后有一黑棒纹及一黑短线，端线黑褐色；后翅褐色；腹部暗灰褐色，背毛簇黑褐色。

分布 广西、四川、云南；缅甸，锡金。

窄带髯须夜蛾 *Hypena occatus* Moore (图版 LXVI-17)

Hypena occatus Moore, 1882, Lep. Atk. p. 191. (印度)

Hypena hampsonialis Wileman, 1911, Trans. ent. Soc. p. 261.

Hypena occatus: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 90. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 654. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 434, pl. 73e. —Sugi, 1982, in

Inoue, Moths Jap. 1: 907, pl. 222, figs. 9—12.

翅展 28—32 mm。头部浅褐灰色杂有少许黑褐色；胸部及前翅浅褐灰色，布有零星黑褐细点，内线黑褐色，自前缘脉外斜至中室后缘折向内斜，前后端较粗，外线双线黑灰色，微波曲内斜，线间亦带黑灰色，故使外线成一窄带状，其内缘在中褶与亚中褶处较内凸，亚端线不明显，隐约可见呈波曲带状，在 5 脉后布有较多黑细点，8 脉处有一小黑斑，约呈三角形，其外侧衬浅黄色，中褶处有一较长黑斑，其外端尖，与 7 脉近端部的一黑色圆小斑相触，前缘脉上有一列黑短纹，近翅外缘有一列黑点，在 6 脉之前呈粗波曲线，顶角较尖外突，缘毛浅褐灰色，中有褐灰线，顶角外缘毛杂灰黑色；后翅褐灰色，缘毛浅褐黄色；腹部浅褐灰色。

寄主 苎麻。

分布 河北；日本，印度。

髯须夜蛾指名亚种 *Hypena proboscidalis proboscidalis* (Linnaeus) (图版 LXVI-18)

Phalaena proboscidalis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 533. (欧洲)

Hypena ochreipennis Moore, 1882, Lep. Atk. part 2: 188.

Hypena proboscidalis: Guenée, 1854, Hist. nat. Ins., Lep. 8: 30. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 654. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 434, pl. 73g. —Forster *et al.*, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 309. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 903, pl. 221, figs. 3, 4. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 385.

翅展 37 mm。头部暗褐灰色，下唇须向前平伸，第三节短，斜向上伸，端部黄白色；胸部暗褐灰色，足浅褐色，但前足外侧黑褐色；前翅灰褐色，布有黑色细点和细纹，内线黑色，自前缘脉微曲外斜至中室后缘折角内斜，环纹只现一黑点，肾纹细窄而模糊，黑褐色，外线黑色，外侧衬白色，内斜，在中脉处微折曲，亚端线不清晰，黑褐色，外侧衬白色，不规则锯齿形，稍间断，在 4 脉处外凸较显，端区明显带有棕色，端线黑色；后翅暗褐灰色；腹部暗褐灰色。

寄主 苎麻、葎草、水苏、羊角芹等属。

分布 黑龙江、新疆、湖北、西藏；日本，印度，欧洲，非洲北部。

髯须夜蛾四川亚种 *Hypena proboscidalis flexilinea* Warren (图版 LXVI-19)

Hypena proboscidalis ssp. *flexilinea* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 435, pl. 73g. (四川)

翅展 38 mm。头部与胸部暗灰褐色；前翅暗灰褐色，布有黑褐色细纹，内线不明显，外线暗褐色，粗而模糊，内侧另有一暗褐影与之平行，前半较明显外弯，亚端线暗褐色，粗而模糊，近呈带状，中段外弯，端区明显带暗褐色；后翅灰褐色；腹部暗灰褐色。