

色，缘毛灰黄色，中有二波浪形暗褐线；腹部浅灰褐色。

分布 云南；印度，斯里兰卡。

碎纹髯须夜蛾 *Hypena belinda* Butler (图版 LXVI-27)

Hypena belinda Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 3: 61, pl. 56, fig. 3. (日本横滨)

Hypena belinda: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 655. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 437, pl. 73i. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 174. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 155, pl. 15, fig. 311.

Harita belinda: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 902.

翅展 31 mm 左右。头部与胸部深棕色，下胸灰色，足跗节外侧褐黑色，各节端部灰白色；前翅内半部棕色，外半部灰色有棕色横行细纹，基线、内线及中线均不清晰，可见黑棕色波曲外斜的多条横线，棕色区的外缘色较深，波浪形，外区前缘有一黑色斜纹，其上有一白点，在 7 脉近端部有一黑纵纹，其上亦有一白点，亚端线不清晰，隐约可见波浪形，翅外缘有一列黑点；后翅褐色。

分布 浙江、西藏；日本，朝鲜。

褐线髯须夜蛾 *Hypena subcyanea* Butler (图版 LXVI-28)

Hypena subcyanea Butler, 1880, Proc. zool. Soc. Lond. p. 681. (台湾)

Hypena subcyanea: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 656. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 437, pl. 75d. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 174. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 908, pl. 222, figs. 30—32.

翅展 24 mm。头部与胸部浅灰褐色；前翅灰褐色，有紫灰色光泽，内线深褐色，强波曲，在中室后明显外突，线内方色较浅，环纹只现一小黑点，由竖立鳞片组成，外线黑褐色，外侧衬白色，微曲内斜至翅后缘中部，亚端线不明显，由一系列黑褐点组成，均衬以白色，端线由一系列新月形暗褐纹组成，缘毛暗褐色；后翅浅灰褐色；腹部褐色。

分布 浙江、湖北、台湾、福建；朝鲜，日本。

线髯须夜蛾 *Hypena strigatus* (Fabricius) (图版 LXVI-29)

Crambus strigatus Fabricius, 1798, Suppl. Ent. Syst. p. 467. (India Orientali)

Hypena reactivitalis Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 84.

Hypena haplochrosta Hulstaert, 1924, Ann. Soc. ent. Belg. 64: 97.

Hypena strigatus: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 81.

Hypena reactivitalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 437. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 385. —Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 909.

翅展 26 mm。头部黄褐色，头顶杂黑褐及灰白色，下唇须外侧褐黑色杂灰色，端