

分布 四川。

**异髯须夜蛾 *Hypena lignealis* Walker (图版 LXVI-20)**

*Hypena lignealis* Walker, [1866] 1865, Cat. Lep. Het. Br. Mus. 34: 1138. (斯里兰卡)

*Hypena lignealis*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 226. —Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus 9: pl. 166, fig. 5. —Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 79. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 444, pl. 75k. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 906, pl. 221, figs. 26—27; pl. 357, figs. 7—8.

翅展 30 mm。头部与胸部浅黄褐色杂有少许暗褐色；雌蛾前翅浅黄褐色，部分布有黑褐细点，内线双线黑色，线间及内侧衬褐黄色，自前缘脉直线外斜至亚中褶，外线色似内线，自前缘脉直线内斜至亚中褶，后端与内线相遇，两线后端的亚中褶有一模糊黑色纵条，中室及其后方杂有黑色，环纹与肾纹小，近圆形，较模糊，外线前段内侧有一黑色斜纹，前缘区在外线内方有一列黑纹，翅脉纹亦黑色，亚端线只现一列粗黑点，列成外曲形，顶角有一赭白色内斜纹，其后方有三条较粗黑纵纹，纹间分界不甚分明，翅外缘有一列新月形黑点，缘毛浅黄褐色间黑褐色；后翅污灰褐色；雄蛾前翅色暗，斑纹更模糊；腹部褐色，雌蛾背毛簇赭褐色，雄蛾背毛簇基部黑色，端部褐色。

分布 四川；日本，斯里兰卡。

**赭褐髯须夜蛾 *Hypena whitelyi* (Butler) (图版 LXVI-21)**

*Cnambus whitelyi* Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 32: 78, pl. 60, fig. 2. (日本)

*Hypena whitelyi*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 435, pl. 73h. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 906, pl. 221, figs. 24—25; pl. 357, fig. 10.

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色，布有黑点；前翅赭褐色，布有黑褐细点，内线不明显，环纹黑色，近圆形，肾纹黑色，小，裂为前后二小斑，环纹与肾纹间有一不清晰的黑纵纹，外线浅赭黄色，直线内斜至翅后缘中部，内侧衬褐色，亚端线由一列黑点组成，中段稍外弯，线外侧衬浅赭黄色，外线与亚端线间的中褶处带有黑褐色，一黑纹自顶角内斜至亚端线，其内侧浅赭色，外侧暗褐色，翅形较长窄；后翅灰褐色，较宽；腹部灰褐色。

分布 湖南；日本。

**小髯须夜蛾 *Hypena taenialoides* Chu et Chen**

*Hypena taenialoides* Chu et Chen, 1962, Acta. ent. Sin. 11 (1): 99. (北京)

*Hypena taenialoides*: Chu et al., 1963, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 1: 147.

翅展 18 mm。头部与胸部淡褐色；前翅褐色，有棕褐色斑纹，基线棕灰色，后半不清，内线双弧形，稍内倾，基线与内线间散布棕色小点，外线一大曲弧形，稍内倾，

内、外线间满布棕色小散点，在中室处更密，中室后方有一不甚清晰的褐色圆斑，四周布满棕色小点，亚端线为一较模糊的灰棕色曲条，顶端达顶角，亚端线与外线间的前缘脉上有三段小黑线，间以灰褐色，端线棕色，缘毛棕灰色间褐色；后翅淡褐色，布有棕色细点，端线由一系列棕色长点组点，缘毛淡褐色。

幼虫身体淡绿色，头部、胸足及腹足黄绿色，背线与亚背线深绿色，半透明，腹足仅三对，第一对退化，第二对较小。

**寄主** 大豆。

**分布** 北京。

生活习性：在北京地区8—9月间发生为害，数量较少，老熟幼虫在叶片间吐丝卷叶化蛹。

### 黑褐髯须夜蛾 *Hypena tenebralis* Moore (图版 LXVI-23)

*Hypena tenebralis* Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 83. (Bengal)

*Hypena tenebralis*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 82. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 659. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 433, pl. 73e.

翅展 37—42 mm。头部与胸部黑褐色；前翅黑褐色，布有灰白色细点，内线黑色，自前缘脉波曲外斜，肾纹隐约可见，黑色，外线黑色外弯，在中褶后内弯，后端与内线靠近，亚端线由一系列黑斑纹组成，其外侧衬白色，但在4脉后为一黑曲线，顶角隐约可见一灰色斜纹，端线由一系列新月形黑纹组成；后翅黑褐色；前翅反面近顶角有一白色小斑和一黑点，后翅反面可见黑色横脉纹与外线；腹部黑褐色。

**分布** 四川、西藏；孟加拉国或印度。

### 肖髯须夜蛾 *Hypena iconicalis* Walker (图版 LXVI-24)

*Hypena iconicalis* Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 61. (斯里兰卡)

*Bomolocha herpa* Swinhoe, 1901, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 8: 20.

*Hypena iconicalis*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 225. —Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 81. —Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 653. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 437, pl. 73k. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 385.

翅展 30 mm。头部深棕色，触角基节白色，触角干背缘有一列黑点，下唇须外侧黑褐色杂灰白色；胸部深棕色；前翅内半部深棕色，外半部灰色带深棕色，分界线灰白色，另有一暗褐色细线约呈直线内斜，亚端线隐约可见，中段二曲形，顶角有一暗褐色内斜纹，纹前方灰色，后方色深暗；后翅暗灰褐色；腹部深棕色。

**寄主** 山蚂蝗属。

**分布** 台湾、广西、海南、四川、西藏；印度，马来西亚，印度尼西亚，斯里兰