

分布 四川。

### 异髯须夜蛾 *Hypena lignealis* Walker (图版 LXVI-20)

*Hypena lignealis* Walker, [1866] 1865, Cat. Lep. Het. Br. Mus. 34: 1138. (斯里兰卡)

*Hypena lignealis*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 226. —Hampson, 1893, Ill. Het. Colln Br. Mus 9: pl. 166, fig. 5. —Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 79. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 444, pl. 75k. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 906, pl. 221, figs. 26—27; pl. 357, figs. 7—8.

翅展 30 mm。头部与胸部浅黄褐色杂有少许暗褐色；雌蛾前翅浅黄褐色，部分布有黑褐细点，内线双线黑色，线间及内侧衬褐黄色，自前缘脉直线外斜至亚中褶，外线色似内线，自前缘脉直线内斜至亚中褶，后端与内线相遇，两线后端的亚中褶有一模糊黑色纵条，中室及其后方杂有黑色，环纹与肾纹小，近圆形，较模糊，外线前段内侧有一黑色斜纹，前缘区在外线内方有一列黑纹，翅脉纹亦黑色，亚端线只现一列粗黑点，列成外曲形，顶角有一赭白色内斜纹，其后方有三条较粗黑纵纹，纹间分界不甚分明，翅外缘有一列新月形黑点，缘毛浅黄褐色间黑褐色；后翅污灰褐色；雄蛾前翅色暗，斑纹更模糊；腹部褐色，雌蛾背毛簇赭褐色，雄蛾背毛簇基部黑色，端部褐色。

分布 四川；日本，斯里兰卡。

### 赭褐髯须夜蛾 *Hypena whitelyi* (Butler) (图版 LXVI-21)

*Cnambus whitelyi* Butler, 1879, Ill. Het. Colln Br. Mus. 32: 78, pl. 60, fig. 2. (日本)

*Hypena whitelyi*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 435, pl. 73h. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 906, pl. 221, figs. 24—25; pl. 357, fig. 10.

翅展 30 mm。头部与胸部灰褐色，布有黑点；前翅赭褐色，布有黑褐细点，内线不明显，环纹黑色，近圆形，肾纹黑色，小，裂为前后二小斑，环纹与肾纹间有一不清晰的黑纵纹，外线浅赭黄色，直线内斜至翅后缘中部，内侧衬褐色，亚端线由一列黑点组成，中段稍外弯，线外侧衬浅赭黄色，外线与亚端线间的中褶处带有黑褐色，一黑纹自顶角内斜至亚端线，其内侧浅赭色，外侧暗褐色，翅形较长窄；后翅灰褐色，较宽；腹部灰褐色。

分布 湖南；日本。

### 小髯须夜蛾 *Hypena taenialoides* Chu et Chen

*Hypena taenialoides* Chu et Chen, 1962, Acta. ent. Sin. 11 (1): 99. (北京)

*Hypena taenialoides*: Chu et al., 1963, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 1: 147.

翅展 18 mm。头部与胸部淡褐色；前翅褐色，有棕褐色斑纹，基线棕灰色，后半不清，内线双弧形，稍内倾，基线与内线间散布棕色小点，外线一大曲弧形，稍内倾，