



图 639 宽带朋闪夜蛾 *Hypersypnoides quadrinotata*
(Leech) ♂ 外生殖器

分布 湖北、贵州。

白点朋闪夜蛾 *Hypersypnoides astrigera* (Butler) (图版 LIX-1)

Sypna astrigera Butler, 1885, Cist. ent. 3: 135. (日本)

Sypna astrigera: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 365. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 365.

Hypersypnoides astrigera: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 366, figs. 117—118. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 867.

翅展 46 mm。头、胸暗棕色；前翅棕色，基线、内线，外线及亚端线黑色，基线、内线波浪形，环纹不显或现一白点，肾纹中央一白圆斑，中线黑褐色波浪形，仅后半明显，外线在 3 脉后内伸至肾纹后折角后垂，后段外侧一黑褐线，亚端线锯齿形，翅外缘一列衬白的黑点；后翅灰褐色，外线与亚端线黑色，后者双线波浪形，翅外缘一列衬白的黑点；腹部黑棕色。

分布 浙江、福建、江西、海南、四川、云南；日本。

斑肾朋闪夜蛾 *Hypersypnoides submarginata* (Walker) (图版 LIX-2)

Tavia submarginata: Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 941. (印度)

Sypna marginalis var. *infrapicta* Strand, 1919, Arch. Naturg. 83: A, 10: 140

Hypersypnoides submarginata: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 369, pl. 19, fig. 43, text figs. 127—128