

翅展 50 mm。头、胸暗褐色杂少许白色；前翅黑褐色，有细白点，基线、内线及外线均由小白斑组成，环纹为一白点，肾纹大，中部为白钩及一白圆斑，外围 6 个白点，亚端线由一列黑斑组成，端线由一列小白圆斑组成；后翅褐色，外线不明显，亚端线微白，仅后段可见，端区与亚端区色暗，翅外缘一列黑点；腹部黑褐带灰色。雄蛾抱器瓣腹缘强凹，阳茎细长，无角状器（图 638）。

分布 福建、四川；印度。

点缘朋闪夜蛾 *Hypersypnoides marginata* (Leech) (图版 LVIII-18)

Sypna marginata Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 543. (中国: Ni-tou)

Sypna marginata form *albipunctata* Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 543. (中国: Ni-tou)

Sypna marginata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 366, pl. 67g. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 161.

Hypersypnoides marginata: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 373, text fig. 137.

翅展 44 mm。头部与胸部深褐色杂少许浅褐黄色及黑褐色，足胫节外侧有褐黄纹；前翅褐色，布有黑褐细点，亚端线外方色浅，基线由一列小白斑组成，自前缘脉后外弯至 1 脉，内侧有一微锯齿形黑线，内线由白色小斑组成，在前缘脉上呈黄白色，在中室为二小斑，亚中褶处不显，1 脉后约呈长方形，各斑外侧均衬黑色，环纹为一白圆小斑，肾纹由小白斑组成，内缘 4 小斑排成直线，外缘 3 小斑排成弧形，中部一斑较大，肾纹中央有一浅黄曲纹，外线亦由白色小斑组成，在前缘脉成双，9 脉后外弯，3 脉后成细长纹，内侧均衬黑褐色，亚端线黑褐色，微波曲，自前缘脉内斜，中段外弯，外线与亚端线间的前缘脉上有一列白点，翅外缘有一列白点，内侧均衬黑色；后翅暗褐色，隐约可见亚端线，约成带状，缘毛褐色；腹部暗褐色，基部背面褐黄色，毛簇端部黑褐色。

分布 台湾、四川、云南；锡金。

湛朋闪夜蛾 *Hypersypnoides distincta* (Leech) (图版 LVIII-19)

Sypna distincta Leech, 1889, Trans. ent. Soc. Lond. p. 136, pl. 9, fig. 10. (江西九江)

Sypna distincta: Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p. 593. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 365. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 364. —Chen, 1992, in Peng. Icon. For. Ins. Hunan p.1021.

Hypersypnoides distincta: Berio & Fletcher, 1958, Ann. Mus. civ. Stor. nat. Giac. Doria 70: 372, text fig. 133.

翅展 42 mm。头部淡褐色，雄蛾触角线形，有纤毛丛；胸部背面淡褐色，颈板深