

黑条，后者宽，顶角及端区带有褐色；后翅反面黄色，2—3脉基部有一小黑斑，亚端区3脉后有一黑色近长方形大斑，其内外缘波曲，前缘区及顶角区布有黑点；腹部黄色，基部几节背面带褐色，其余各节背面有黑色横条。

分布 台湾、云南；印度，巴布亚新几内亚。

鹰夜蛾 *Hypocala deflorata* (Fabricius) (图版 LXII-19)

Hyblaea deflorata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 127. (India Orientali)

Hypocala moorei Butler, 1892, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 10: 21.

Hypocala moorei: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 382. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 371.

翅展 40—44 mm。头部与胸部灰褐色杂黑色；前翅紫灰色，雄蛾前缘区大部及中室带有红棕色，内线黑棕色，自前缘脉外斜至中室后缘折向内斜，环纹只现一黑点，中线黑棕色，较粗，在中室后明显，肾纹大，不清晰，边缘红棕色，外线黑棕色，自前缘脉后外弯，在中褶处内凸，4脉后内伸至肾纹后波浪形外斜，亚端线黑色，内侧各翅有黑短纹，一白斜纹自顶角至外线；后翅黄色，横脉纹大，黑色，端区一黑宽带，亚中褶一黑纵纹；雌蛾前翅暗灰色，亚端线明显黑色，其余线纹不明显；腹部黄色有黑横条。

寄主 柿。

分布 河北、山东、福建、广东、海南、四川、贵州；日本，印度，泰国。

钩鹰夜蛾 *Hypocala rostrata* (Fabricius) (图版 LXII-20)

Hyblaea rostrata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3, 2: 127. (India Orientali)

Hypocala angulipalpis Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 77.

Hypocala plumicornis Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 75.

Hypocala efflorescens Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 77.

Hyblaea bohemani Wallengren, 1856, Antec. zool. p. 67.

Hyblaea genuina Wallengren, 1856, Antec. zool. p. 66.

翅展 36 mm。头部与胸部褐白色，布有零星黑点；前翅浅灰褐色，散布黑色细点，各横线均不清晰，前缘区有黑褐纹，在内区较密，隐约可见暗褐边的肾纹，亚端线白色，不规则波浪形，中段外弯，线内侧模糊黑褐纹连成一带状，翅外缘有一列模糊黑褐纹；后翅黄色，横脉纹黑色，大而模糊，端区有一黑带，其前端伸达肾纹前端，内缘中部内突成一齿，外缘近中部内凹，后端在1脉后内伸达翅后缘基部，亚中褶有一黑纵纹自基部伸至外区；腹部黄色，背面各节前半带黑色。

分布 四川；印度。

苹梢鹰夜蛾 *Hypocala subsatura* Guenée (图版 LXII-21)

Hypocala subsatura Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 75. (Sil-