

黑条，后者宽，顶角及端区带有褐色；后翅反面黄色，2—3脉基部有一小黑斑，亚端区3脉后有一黑色近长方形大斑，其内外缘波曲，前缘区及顶角区布有黑点；腹部黄色，基部几节背面带褐色，其余各节背面有黑色横条。

分布 台湾、云南；印度，巴布亚新几内亚。

鹰夜蛾 *Hypocala deflorata* (Fabricius) (图版 LXII-19)

Hyblaea deflorata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 127. (India Orientali)

Hypocala moorei Butler, 1892, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 10: 21.

Hypocala moorei: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 382. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 371.

翅展 40—44 mm。头部与胸部灰褐色杂黑色；前翅紫灰色，雄蛾前缘区大部及中室带有红棕色，内线黑棕色，自前缘脉外斜至中室后缘折向内斜，环纹只现一黑点，中线黑棕色，较粗，在中室后明显，肾纹大，不清晰，边缘红棕色，外线黑棕色，自前缘脉后外弯，在中褶处内凸，4脉后内伸至肾纹后波浪形外斜，亚端线黑色，内侧各翅有黑短纹，一白斜纹自顶角至外线；后翅黄色，横脉纹大，黑色，端区一黑宽带，亚中褶一黑纵纹；雌蛾前翅暗灰色，亚端线明显黑色，其余线纹不明显；腹部黄色有黑横条。

寄主 柿。

分布 河北、山东、福建、广东、海南、四川、贵州；日本，印度，泰国。

钩鹰夜蛾 *Hypocala rostrata* (Fabricius) (图版 LXII-20)

Hyblaea rostrata Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3, 2: 127. (India Orientali)

Hypocala angulipalpis Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 77.

Hypocala plumicornis Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 75.

Hypocala efflorescens Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 77.

Hyblaea bohemani Wallengren, 1856, Antec. zool. p. 67.

Hyblaea genuina Wallengren, 1856, Antec. zool. p. 66.

翅展 36 mm。头部与胸部褐白色，布有零星黑点；前翅浅灰褐色，散布黑色细点，各横线均不清晰，前缘区有黑褐纹，在内区较密，隐约可见暗褐边的肾纹，亚端线白色，不规则波浪形，中段外弯，线内侧模糊黑褐纹连成一带状，翅外缘有一列模糊黑褐纹；后翅黄色，横脉纹黑色，大而模糊，端区有一黑带，其前端伸达肾纹前端，内缘中部内突成一齿，外缘近中部内凹，后端在1脉后内伸达翅后缘基部，亚中褶有一黑纵纹自基部伸至外区；腹部黄色，背面各节前半带黑色。

分布 四川；印度。

苹梢鹰夜蛾 *Hypocala subsatura* Guenée (图版 LXII-21)

Hypocala subsatura Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 75. (Sil-

het)

Hypocala aspersa Butler, 1883, Proc. zool. Soc. p. 164.

Hypocala subsatura var. *limbata* Butler, 1889, Ill. Het. Colln Br. Mus. 7: 76.

Hypocala subsatura: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 382. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 370. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 108.

翅展 38—42 mm。头部与胸部灰褐色；前翅红棕色带灰色，密布黑棕色细点，内线棕色，波浪形外弯，肾纹不清晰，可见黑边，外线黑棕色，波浪形，自前缘脉后外斜，在 7 脉处折向后并内弯于中褶，4 脉后内伸至肾纹折向后垂，亚端线棕色；后翅黄色，横脉纹大，亚中褶一黑纵条，端区一黑宽带；腹部黄色有黑横条。

寄主 苹果、栎。

分布 内蒙古、辽宁、甘肃、河北、陕西、山东、河南、江苏、浙江、台湾、福建、广东、海南、云南、西藏；日本，印度，孟加拉国。

多型种，常见前翅一扭角形大黑棕斑的变异。

层夜蛾属 *Schistorhynx* Hampson

Schistorhynx Hampson, 1898, J. Bomb. nat. Hist. Soc. 11: 706.

Type-species: *Schistorhynx argentistriga* Hampson.

喙发达，下唇须长弯，第三节长，上缘有长鳞片，雄蛾触角双栉形，中、后足胫节有毛簇；前翅前缘稍凹，近顶角处稍拱曲，外缘斜曲；后翅外缘后部微凹。

白纹层夜蛾 *Schistorhynx lobata* Prout (图版 LXII-22)

Schistorhynx lobata Prout, 1925, Ann. Mag. nat. Hist. 9, 16: 403. (Sarawak)

Schistorhynx lobata: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 35. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 104, pl. 34, fig. 12.

翅展 32 mm。头部灰白色，触角基节后侧黑色，头顶有一黑纵纹，两触角间有二前伸的毛簇，其内缘均黑色，下唇须长，斜向上伸，第 1、2 节外侧有一黑纵条，第二节端半部上缘有长毛簇，第三节上缘除端部均饰长毛簇；胸部浅褐灰色，颈板杂有黑色，近端部有一黑色弧形横纹，胸背有一黑斑，翅基片内外缘褐色，内缘有一黑色细纵线，足褐色；前翅底色浅灰，大部带有褐色，后缘区及端区布有黑褐细点，基线与内线仅在前缘区现一白色斜纹，两侧衬黑色，中室基部有一白色纵纹，后侧衬黑色，亚中褶基部有一白纵纹伸达内区，前缘衬黑色，后缘衬深棕色，中室前半有一白色纵纹，自中室近基部伸达亚端区，两端尖，前后缘衬黑色，中脉有一黑纵线，3—4 脉间有一白色梭形纹伸达亚端区，其后缘衬黑色，亚端区至端区有 5 根弯曲内斜线，内一线粗，浓黑，自 9 脉内斜至亚中褶，向后渐细，外侧二黑线与之近平行，前细后粗，端区内一线