区外半及后缘红色，横脉纹小，褐色，内线褐色，微波曲内斜，中线细波浪形，在翅脉上有暗褐点，亚端线不清晰，外弯，近翅外缘有一列暗褐点，外侧衬白色；腹部红色，基部背面红褐色。

分布；云南；斯里兰卡。

变色夜蛾 *Hypopyra vespertilio* (Fabricius)（图版Ⅱ-8）

Noctua vespertilio Favricius, 1787, Mant. Ins. 2: 136.（印度）

Hypopyra shiva Guenée, 1852, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 199.

Enmonodia hypopyroides Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1333.

Enmonodia vespertilio: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 328. ——Gaede, 1938, *in* Seitz, Macrolep. World 11: 465. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 76—80 mm。头与颈板暗褐色；胸部褐灰色；前翅浅褐灰色略带青色，有变化，大部密布黑棕细点，内线黑色内弯，肾纹窄，黑棕色，后外侧有三个卵形黑褐斑，中线黑棕色波浪形，后半直，外方另一棕色线，外线黑棕色波浪形，在翅脉上为黑点，亚端线灰色波浪形，外侧暗褐，顶角一暗棕纹，端区棕色；后翅褐灰色，中、外线棕黑色，中线双线，外线波浪形，亚端线暗灰色波浪形，端区带有青色，后缘杏黄色，雄蛾前翅肾纹弱；腹部杏黄色，基部几节背面带灰色。

寄主 楹树、藤。

分布 山东、江苏、浙江、福建、江西、广东、海南、云南；日本，印度，缅甸，印度尼西亚。

朴变色夜蛾 *Hypopyra feniseca* Guenée（图版Ⅱ-9）

Hypopyra feniseca Guenée, 1852, *in* Boisduval *et* Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 200.（印度中部）

Enmonodia feniseca: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 333. ——Gaede, 1938, *in* Seitz, Macrolep. World 11: 465. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 89 mm。头与颈板黑棕色；胸部与前翅浅褐灰色，前翅顶角尖突，内线黑棕色波浪形，在翅脉上为黑点，肾纹模糊，后外侧二黑点，中线双线暗褐色波浪形，后半直线内斜，外线黑棕色波浪形，在翅脉上为黑点，亚端线灰白色锯齿形，顶角隐约可见一内斜淡纹，端线双线黑色；后翅灰褐色，端区棕色，中线双线黑褐色，后半直，外线暗灰色波浪形，亚端线灰褐色锯齿形，端线黑棕色；腹部褐灰色，腹面绯红。

分布 福建、广东、四川；锡金，印度，印度尼西亚。

环夜蛾属 *Spirama* Guenée

Spirama Guenée, 1852, *in* Boisduval *et* Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 194.