

## 种 检 索 表

1. 雄蛾触角有鬃 ..... 2  
   雄蛾触角无鬃 ..... 3
2. 前翅中室有一黑点 ..... 镶变色夜蛾 *Hypopyra unistrigata*  
   前翅中室有 2 黑点 ..... 南变色夜蛾 *H. meridionalis*
3. 雄蛾腿节与胫节之间有毛束 ..... 变色夜蛾 *H. vespertilio*  
   雄蛾腿节与胫节之间无毛束 ..... 朴变色夜蛾 *H. feniseca*

镶变色夜蛾 *Hypopyra unistrigata* Guenée (图版II-5)

*Hypopyra unistrigata* Guenée, 1952, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 201, pl. 21, fig. 1. (Bengal)

*Spirama unistrigata*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 555.

*Enmonodia unistrigata*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 336. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 465. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 352.

翅展 53 mm。头部红棕色，下唇须基部赤黄色；颈板红棕色；胸部背面淡褐灰色，下胸及足腿节赤黄色，雄蛾前足腿节膨大，端部有毛簇，各足胫节与跗节灰褐色；前翅淡褐灰色，部分带有红棕色，端区大部暗棕色，内线弱，棕色，波浪形，稍外弯，在各翅脉上有黑棕点，肾纹黑棕色，后半外倾，中线黑棕色，自前缘脉后外斜至 6 脉，折角内斜并呈细波浪形，外线细，棕色，波浪形，曲度与中线相似，在各翅脉上有棕色点，亚端线细，双线棕色，线间灰白色，较直内斜，端线黑棕色，波浪形；后翅淡褐灰色，端区带有深棕色，中室有一黑棕点，中线黑棕色，细锯齿形内斜，外线暗棕色，波浪形，在各翅脉上有黑点，外侧灰色及深褐色，亚端线灰白色，端线灰色，波浪形，在各翅脉上有黑点；腹部橙黄色，基部几节背面淡褐灰色，布有黑棕点，腹面带有赤黄色。

**分布** 广东、云南；锡金，印度，缅甸，孟加拉国。

南变色夜蛾 *Hypopyra meridionalis* (Hampson) (图版II-7)

*Enmonodia meridionalis* Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 341. text fig. 66. (斯里兰卡)

*Enmonodia meridionalis*: Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 466, pl. 50d.

翅展 45 mm。头部与胸部褐色，胸背杂有灰色，下唇须基部红色，下胸与足腿节黄色带红色，胫节与跗节灰褐色；前翅红褐色，内线褐色，波浪形，肾纹小，前后部各为一黑色小斑，围以灰色边，中线褐色，波曲，中室后不显，外线褐色，在前缘区较粗，其后波浪形内斜，外侧衬绿灰色，亚端线双线褐色，线间浅黄色，较直内斜，外线与亚端线间的前缘区色较暗，近翅外缘有一列暗褐点，外侧衬白色；后翅红褐色，前缘