

在前缘区现一黑点，外线黑色，稍波曲，4脉后内斜，亚端线仅在6脉前现一模糊暗褐纹；后翅灰黑色，缘毛白色。

分布 四川、西藏。

后冬夜蛾属 *Hypsophila* Staudinger

Hypsophila Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. 49: 40.

Type-species: *Heliothis jugorum* Erschov.

喙发达，下唇须向上伸，约达头顶，前缘饰长毛，复眼小，肾形，雄蛾触角线形，有纤毛丛，额光滑；胸部被长毛；腹部被绒毛；前翅三角形，外缘斜曲，有一副室；后翅5脉细弱，6、7脉共一短柄。

后冬夜蛾 *Hypsophila jugorum* (Erschov) (图版 XXVI-25)

Heliothis jugorum Erschov, 1874, Fedtsch, Reiss: 48, pl. 3, fig. 46. (Turkestan)

Hypsophila jugorum: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 419. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 317.

翅展 26mm。头、胸及前翅绿灰色，前翅带褐色并布有暗褐细点，内、外线暗褐色，后者锯齿形，环纹小，灰色，肾纹暗褐色灰边，亚端线不明显，内侧衬暗褐色；后翅白色，端区有一黑宽带，横脉纹长方形，黑色；腹部暗褐灰色。

分布 新疆；中亚地区，印度。

梳冬夜蛾属 *Cteipolia* Staudinger

Cteipolia Staudinger, 1896, Iris, 9: 191.

Type-species: *Cteipolia sacelli* Staudinger.

喙退化，下唇须短，向前平伸，只达额前缘，额光滑无突起，复眼较窄，近椭圆形，雄蛾触角有长纤毛；头、胸及腹部均被长毛，无毛簇；前翅狭窄，有一副室；后翅6、7脉共柄。

梳冬夜蛾 *Cteipolia sacelli* Staudinger (图版 XXVI-26)

Cteipolia sacelli Staudinger, 1896, Iris 9: 191. (Issyk-kul)

Cteipolia sacelli: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 421. ——Warren, 1911, in Seitz, Macrolep. World 3: 256. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 317.

翅展 32mm。头部褐色杂有灰色，雄蛾触角有长毛；胸部褐色杂灰色；前翅褐灰色，布有黑褐色细点，外区微带紫红，中室基部有一黑色纵纹，基线仅在前缘脉可见一