

色，波浪形，前端为一黑粗点，后端内侧有一黑斑，中线黑色，在中室上不显，然后内斜，自3脉后与外线间成一明显黑块，环纹与肾纹暗褐色，白边，外线双线黑色，线间白色，内一线前端为粗点，外一线外侧有一列齿形黑点，亚端线白色，内侧有不规则形黑纹，端线为一列黑点；后翅褐色；腹部灰色杂褐黄色。

**分布** 山东、湖北、云南；日本，印度，不丹，非洲。

### 日雅夜蛾 *Iambia japonica* Sugi (图版 XXXIII-45)

*Iambia japonica* Sugi, 1958, Tinea, 4: 191, pl. 25, fig. 13; pl. 24, fig. 23. (日本)

*Iambia japonica*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 784. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 269.

翅展 33 mm。头、胸黑褐杂白色；前翅白色；除臀角外均布褐点，中区后半带黑色，似一模糊的斜斑块，基线模糊黑褐色，内线双线黑色，波浪形，后端内侧有一模糊的黑纹，环纹与肾纹有不明显黑色边缘，外线双线黑色，线间微白，内一线粗，亚端线白色，后半白色扩展，端线为一列三角形黑点，4—6脉间的点联合，臀角处缘毛白色中有黑细线，其余缘毛黑色；后翅褐色；腹部暗褐杂暗黄色。

**分布** 福建、广西；日本。

## 灿夜蛾属 *Aucha* Walker

*Aucha* Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln. Br. Mus. 13: 1137.

Type-species: *Aucha velans* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节中长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛；胸部几全是鳞片，前胸无毛簇，后胸有较平缓的毛簇；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳，有副室。

### 种 检 索 表

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. 雄蛾前翅亚中褶有黄斑 .....  | 异灿夜蛾 <i>Aucha variegata</i> |
| 雄蛾前翅亚中褶无黄斑 .....     | 2                           |
| 2. 翅展 35—40 mm ..... | 3                           |
| 翅展 28—30 mm .....    | 漆灿夜蛾 <i>A. dizyx</i>        |
| 3. 前翅灰褐色 .....       | 天目灿夜蛾 <i>A. timushani</i>   |
| 前翅黑褐色 .....          | 黑褐灿夜蛾 <i>A. pronans</i>     |

### 异灿夜蛾 *Aucha variegata* (Oberthür) (图版 XXXIII-45)

*Acontia variegata* Oberthür, 1879, Diag. Lep. Askold, p. 15. (Askold)