

in Seitz, *Macrolep. World*, 11: 169. ——Chen, 1985, *Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct.* 4: 36.

翅展 28 mm。头、胸白色杂紫棕及褐黄色；前翅浅褐色，大部杂有紫灰色，基线双线黑色，间断为点，内线双线，内一线粗而间断，黑色，外一线前段为方形黑点，其后为黑点及棕红线，剑纹端部为黑点，环纹灰色近长方形，肾纹灰色长方形，两纹间有黑方斑，环纹内侧与肾纹外侧各一黑条，中线前段为双黑条，在中室后红棕色，外线白色，两侧红棕色，亚端线白色与外线间有一黑棕大斑，前宽后窄；后翅浅褐色；腹部灰色。

分布 云南；锡金。

桂雅夜蛾，新种 *Iambia guangxiana* Chen sp. nov. (图版 XXXIII-41)

翅展 30 mm。头部深棕色，头顶有黑棕色横纹，额下部白色，触角黑褐色，下唇须外侧褐灰色；胸部背面暗棕色，颈板基半部带有灰白色，中部有 2 黑横线，下胸灰黄色，足跗节外侧黑棕色，各节间有白斑；前翅内线内方黄褐色，其余大部黑棕色，基线双线黑棕色，波浪形，自前缘脉至 1 脉，线间褐黄色，内线双线黑色，波浪形外弯，线间褐黄色，线内方在 1 脉后有一黑褐条，环纹近方形，黑褐色，黑边，中线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至中室下角，折角强内斜，肾纹窄，黑褐色，黑边，中央有褐黄纹，中室前半有一黑纵纹，中室后在内、外线间有一黑纵条，肾纹至外线间有黑褐纵纹，外线双线黑色，在前缘脉上为双斜纹，在 8 脉后呈锯齿形，在 4 脉后内斜并稍内弯于亚中褶，线间部分带褐黄色，外区前缘脉有 3 个黄色点，亚端线隐约可见褐黄色，在 3—7 脉间呈二曲形，其后波浪形内斜，端区在中褶处有一黑纹，翅外缘有一列新月形黑点，缘毛黑棕色，基部有一褐黄线；后翅棕色有光泽，顶角区色黑褐，缘毛浅黄色，中有一黑褐线，向后色渐浅；腹部褐灰色。

正模 ♀，广西凭祥，230 m，1976，VI. 13，张宝林采。

本种近似 *Iambia nocturna* Hampson 和 *I. transversa* (Moore)，主要区别为：前翅内线内方明显色浅，亚端线内侧在 4 脉前无白色楔形纹；本种与 *I. tessellata* (Prout) 的雄蛾外形略似，但与雌蛾明显不同。

贯雅夜蛾 *Iambia transversa* (Moore) (图版 XXXIII-42)

Tyracona transversa Moore, 1882, *Lep. Atk.* p. 95, pl. 4, fig. 5. (大吉岭)

Iambia sinica Yang, 1946, *Acta ent. Sin.* 13: 455.

Iambia transversa: Hampson, 1908, *Cat. Lep. Phal. Br. Mus.* 7: 657. ——Chen, 1982, *Icon. Het. Sin.* 3: 269

翅展 31 mm。头、胸黑白混杂；前翅灰白带紫褐基线黑色，只达 1 脉，内线双线黑

色，波浪形，前端为一黑粗点，后端内侧有一黑斑，中线黑色，在中室上不显，然后内斜，自3脉后与外线间成一明显黑块，环纹与肾纹暗褐色，白边，外线双线黑色，线间白色，内一线前端为粗点，外一线外侧有一列齿形黑点，亚端线白色，内侧有不规则形黑纹，端线为一列黑点；后翅褐色；腹部灰色杂褐黄色。

分布 山东、湖北、云南；日本，印度，不丹，非洲。

日雅夜蛾 *Iambia japonica* Sugi (图版 XXXIII-45)

Iambia japonica Sugi, 1958, Tinea, 4: 191, pl. 25, fig. 13; pl. 24, fig. 23. (日本)

Iambia japonica: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 784. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 269.

翅展 33 mm。头、胸黑褐杂白色；前翅白色；除臀角外均布褐点，中区后半带黑色，似一模糊的斜斑块，基线模糊黑褐色，内线双线黑色，波浪形，后端内侧有一模糊的黑纹，环纹与肾纹有不明显黑色边缘，外线双线黑色，线间微白，内一线粗，亚端线白色，后半白色扩展，端线为一列三角形黑点，4—6脉间的点联合，臀角处缘毛白色中有黑细线，其余缘毛黑色；后翅褐色；腹部暗褐杂暗黄色。

分布 福建、广西；日本。

灿夜蛾属 *Aucha* Walker

Aucha Walker, [1858] 1857, List Spec. Ins. Colln. Br. Mus. 13: 1137.

Type-species: *Aucha velans* Walker.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节中长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有细纤毛；胸部几全是鳞片，前胸无毛簇，后胸有较平缓的毛簇；前翅顶角较钝，外缘曲度平稳，有副室。

种 检 索 表

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. 雄蛾前翅亚中褶有黄斑 | 异灿夜蛾 <i>Aucha variegata</i> |
| 雄蛾前翅亚中褶无黄斑 | 2 |
| 2. 翅展 35—40 mm | 3 |
| 翅展 28—30 mm | 漆灿夜蛾 <i>A. dizyx</i> |
| 3. 前翅灰褐色 | 天目灿夜蛾 <i>A. timushani</i> |
| 前翅黑褐色 | 黑褐灿夜蛾 <i>A. pronans</i> |

异灿夜蛾 *Aucha variegata* (Oberthür) (图版 XXXIII-45)

Acontia variegata Oberthür, 1879, Diag. Lep. Askold, p. 15. (Askold)