形态特征　虫体呈花瓶状。口围缘与体部间明显缢进，口围坚实而宽厚，口围盘倾斜凸出。前庭和胞咽呈三袋形。表膜光滑。内质无色，常有多个食物泡。伸缩泡 1 个大，位于口围缘上。大核较细，呈“C”字形，横位。游泳体盘状。口器内 P_1、P_2 均来自 P；P_3 较长，2 条；支持体与咽下支持物明显可见。反口纤毛环单列。群体为规则的双叉分枝，枝群高大；柄内肌丝细索状，极细弱 (非染色不可见)，柄完全不收缩，肌丝长约等于体长，相邻个体间肌丝常互相连接。

生态特征　采自沿海岸养殖对仔虾体表。

地理分布　山东 (牟平)。

(215) 内褶间隙虫 *Intranstylum invaginatum* (Stokes, 1886) (图版 LXXIII: 215)

Rhabdostyla invaginatum Stokes, 1886: 81-86.

Intranstylum invaginatum: Kahl, 1935: 712; Stiller, 1941-1942: 411-412; Matther, 1950: 445; Stiller, 1971: 172, fig. 101a; Piesik, 1975: 53, fig. 9; Jiang, Shen *et* Gong, 1983: 173, pl. 35, fig. 298.

体长：32-40 μm；
体宽：12.3-15.0 μm；
口围直径：10 μm；
口围盘直径：6.3 μm；
柄长：10 μm；
柄宽：2.3 μm。

形态特征　虫体为小型个体。体呈长花瓶形。体长为体宽的 2.5 倍左右。本体中部为最宽，后部梨形延长。口围盘呈丘状凸出，口围比体宽稍窄些。口前庭和胞咽狭短，只伸向体前 1/5 处，以细菌为食，在胞咽内形成小的纺锤形食物泡落入细胞质后变成小圆形。表膜横纹极为细密，不很明显，但有整齐细微可数的纵条纹，尤其在体两侧更为明显。细胞质灰色不十分透明，除有少量食物泡外，多被细小颗粒物所充满。伸缩泡 1 个，位于口围缘上，每 20s 收缩一次。大核马蹄形，横于体前 1/3 处。柄短，呈倒锥形连接着本体，柄内肌丝极短。虫体收缩时，本体后部下垂将大部分柄套包起来，柄不收缩，亦不弯曲，只是形成不规则的横褶，虫体伸展时此横褶亦不消失。收缩的个体呈桃核形，顶端内陷后的合缝偏斜。

生态特征　生活在沼泽草滩上的泉水、水坑、静水和寡污湖池中，附着在轮藻、枝角类上。

地理分布　陕西 (西安)、西藏；德国，匈牙利，美国。

(216) 巨柱间隙虫 *Intranstylum macrostylum* (D'Udekem, 1862) (图版 LXXIII: 216)

Intranstylum (*Zoothamnium*) *macrostylum* D'Udekem, 1862: 1-34; Kahl, 1935: 711; Szczepanowski, 1978: 49.

体长：35.9 μm；

体宽：21.6 μm；
口围直径：21.6 μm；
柄长：23.96 μm；
柄宽：9.6 μm；
基柄长：25.07 μm；
基柄宽：4.8 μm。

形态特征 体呈椭圆筒形。体最宽处位于体中部稍偏下。口围缘厚，具有环纹，口围盘平坦不凸出。口围宽度等于体宽。口前庭狭窄长，胞咽短小，直伸到体前 1/3 处。外质表膜横纹很清楚。内质带黄色。伸缩泡 1 个位于口围缘下前庭的下侧。大核为“C”字形，斜向横位在中部。在体末有一细胞质颗粒较大而色暗的区域。基柄较远离个体之柄稍窄，且无肌丝。肌丝只限于体柄。共见到 2 个群体，每一群体皆只有 2 个个员。

生态特征 采自湖岸边。本种着生在日本沼虾 *Macrobrachium nipponensis* 的游泳足上。

地理分布 湖北 (武汉东湖)；德国，波兰。

(217) 虾间隙虫 *Intranstylum palaemoni* Nie *et* Ho, 1943 (图版 LXXIV: 217)

Intranstylum palaemoni Nie *et* Ho, 1943: 144-146, fig. 2.

体长：42.5 (35.0-47.0) μm；
体宽：27.5 (25.0-32.0) μm；
柄长：34-38 μm；
体柄宽：10 (7.7-11.0) μm；
基柄宽：6 (5-8) μm。

形态特征 单生或小的群体。身体伸长时为梨形，收缩时或多或少为球形。口围与体前端部有一缩缢，中部为体最宽处，口围盘呈弧形凸出，盘顶呈锥状凸出在口围之上。前庭中等深。外质表膜上有清晰的环纹，体内含有少许食泡和颗粒状物。伸缩泡 2 个，很小，几乎不易看见，它们交替地伸缩。大核呈腊肠式位于体中心。体末端连接着柄前端，柄较粗壮但收缩性较弱，向柄基部末稍渐渐地变窄。在柄上可清晰地看到横环纹，从柄的边缘看似锯齿状。首柄分枝为双分枝型，中央有绳索状的肌丝，在每个分枝的梢端有 1 个虫体。群体小，只有 2-4 个个体，4 个以上个体为稀罕的。

生态特征 生活在富营养的池塘和河流内。外寄生在淡水的小虾上，经常附着在鳃片的两旁或在宿主的游泳体末梢环节上。

地理分布 江苏 (南京)。

(218) 迭式间隙虫，新种 *Intranstylum plicoforme* Gong, sp. nov. (图版 LXXIV: 218)

体长：45-60 μm；
体宽：33-43 μm；
口围直径：24-32 μm；