

Moths SE Asia, p. 104.

翅展 46 mm。全体棕赭色；前翅内线黑棕色波浪形外弯，环纹为一黑点，肾纹棕色黑边，外缘中凹，外线黑棕色锯齿形，在 2 脉处回升至肾纹后再折向后行，顶角一黑棕内斜线，雄蛾亚中褶一棕色环，雌蛾则为二红棕斑，中央白色；后翅外线黑棕色锯齿形，亚端线不明显。

寄主 稻、杂草。

分布 湖南、福建、广东、海南、云南；印度尼西亚。

妖夜蛾属 *Iontha* Doubleday

Iontha Doubleday, 1842, Entomologist 1: 297.

Type-species: *Iontha umbrina* Doubleday.

喙发达，下唇须向上伸，第二节紧贴前额，约达头顶，第三节短，无毛，雄蛾触角锯齿形，胸部被平滑鳞片；腹部极长，臀毛簇发达，散开呈扇形，后足胫节及第一跗节外侧饰长毛；前翅前缘外半拱曲，翅后缘弧形，顶角尖，外缘前半微锯齿形，后半强内斜；后翅顶角强外突成齿，臀角强外突，外缘中凹明显，8 脉外半弯曲。

妖夜蛾 *Iontha umbrina* Doubleday (图版 LXI-14)

Iontha umbrina Doubleday, 1842, Entom. 1: 298. (Bengal)

Platyja rufiscripta Swinhœ, 1904, Trans. ent. Soc. p. 141.

Iontha umbrina: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 541. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 104, pl. 34, fig. 5.

翅展 51 mm。头部黑褐色，下唇须第三节有小灰斑；胸部背面暗棕色带灰色，下胸黑褐色，有二交叉白色条纹，前足腿节与胫节外侧有较长黑褐毛，内侧大部白色，中足与后足胫节外侧褐色，前足与中足跗节灰色带褐色，各节间有灰白斑，后足跗节饰暗褐毛；前翅暗棕色，隐约可见内线，环纹仅现一黑褐点，肾纹深褐色，不明显，边缘微带灰白色，中线深褐色，仅在中室后可见波浪形达翅后缘，外区在 5 脉前有一模糊黄褐斑，自亚前缘后外斜，翅外缘有一灰白色带，其中可见黑褐色波浪形端线，缘毛暗褐色，基部与端部灰白色，翅外缘极斜，臀角圆钝，翅后缘基半部饰较长毛；后翅深褐色，外区有一列灰白点，端区带有紫白色，但达顶角，其中有一列新月形深褐点，翅外缘直，顶角强外突，臀角前有一钝齿形突，此二突的外缘毛暗棕色，其余灰白色杂褐色；腹部背面暗褐色，腹面黄白色，臀毛簇黑色。

分布 海南；孟加拉国，印度，马来西亚，印度尼西亚。

描述据雄蛾，手头无雌蛾标本。