

## 蓝条夜蛾属 *Ischyja* Hübner

*Ischyja* Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 265.

Type-species: *Phalaena manlia* Cramer.

*Potamophora* Guenée, 1852. in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 122.

喙发达，下唇须第二节宽，下缘饰鳞，第三节长，斜伸；雄蛾触角线形，有纤毛丛；前足胫节有毛簇，后足胫节有长毛；前翅前缘近端强拱曲，顶角较尖，外缘斜曲；后翅中室很短，雄蛾 2、3、4 脉基半部接近。

### 种 检 索 表

前翅顶角一明显斜纹 ..... 窄蓝条夜蛾 *Ischyja ferrifracta*  
前翅顶角无明显斜纹，肾纹后有三角形黑斑 ..... 蓝条夜蛾 *I. manlia*

### 蓝条夜蛾 *Ischyja manlia* (Cramer) (图版 LXI-15)

*Phalaena Noctua manlia* Cramer, 1766, Uitl. Kapell. 3: 144, pl. 92, fig. A.

*Ischyja manlia*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 537. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 379. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 369.

翅展 85—100 mm。头、胸及前翅红棕或黑棕色。雄蛾前翅内线褐黑色，内侧衬黄色，后半不显，环纹、肾纹大，浅褐灰色，后者前端尖，外缘齿形，后端内突，后方一黄色三角形斑，其外侧一大三角形黑斑，亚中褶近基部一黄色曲纹，外区一直内斜线，其内方色暗，外方较灰，亚端线黑褐色波浪形，6 脉中段一黄白点，3 脉端一黑点；后翅黑棕色，外区一粉蓝曲带，1 脉近端部一黑斑，中有黄纹；雌蛾环、肾纹小，外线蓝白色直线内斜，后翅粉蓝带较宽；腹部黑棕色。

**寄主** 榄仁树属、樟属。

**分布** 山东、浙江、湖南、福建、广东、海南、广西、云南；印度、缅甸，斯里兰卡，菲律宾，印度尼西亚等。

### 窄蓝条夜蛾 *Ischyja ferrifracta* (Walker) (图版 LXI-16)

*Potamophora ferrifracta* Walker, 1865 1864, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 177. (Borneo)

*Ischyja glaucopteron* Hampson, 1891, Ill. Het. 8: 19, 88, pl. 147, fig. 19.

*Ischyja schlegelii*: Snellen, 1884, Tijd. v. Ent. 28: 4.

翅展 80 mm。头、胸、腹及前翅深褐带灰色，前翅后部有黑棕和黄白细点和细纹，一橙黄带自顶角内斜至中褶，基线黑褐色，内线、中线赭黄色，环纹灰褐色，后缘黑色内伸，肾纹大内缘中凸，外缘外凸成尖齿，后端伸出一赭黄曲线，外线黄灰色，在 7 脉