

Seitz, Macrolep. World 11: 314, pl. 28d.

Masalia cruentata: Seymour, 1972, Bull. Br. Mus. Ent. 17 (1): 47. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 687, pl. 168, fig. 11.

翅展 30 mm。头部赭黄色带褐色，触角干背缘白色；颈板赭白色微带褐色，胸部背面黄白色带桃红色；前翅麦秆黄色，前缘区与后缘区桃红色，后者还带有暗褐色，缘毛桃红色；后翅麦秆黄色，后半带有暗褐色；腹部赭黄色。

分布 四川；日本，印度，锡金，克什米尔地区。

京夜蛾属 *Jingia* Chen

Jingia Chen, 1983, Acta Zootaxon. Sin., 8 (1): 78.

Type-species: *Jingia vestigialis* Chen.

喙发达，下唇须斜向前伸，第三节小，额突起微呈球面形，其下方有一角质片状突起，复眼大，圆形，无纤毛或睫毛；胸部被毛及少许鳞片，前足胫节短宽，端部内侧有一粗而短的爪，中足胫节端部具刺，后足胫节无刺；前翅稍窄，外缘斜直，8、9脉共柄，与10脉合成一副室；后翅翅脉三岔型，6、7脉共柄。

模式种：*Jingia vestigialis* Chen。

本属与 *Timora* Walker 及 *Hebdomochondra* Stgr. 较近，但前足胫节端部外侧无爪，后足胫节无刺。

京夜蛾 *Jingia vestigialis* Chen (图版Ⅶ-18)

Jingia vestigialis Chen, 1983, Acta Zootaxon. Sin. 8 (1): 78, fig. 1, 2. (北京)

翅展 25 mm。头部与胸部淡赭黄色，足跗节带有褐色；前翅淡赭黄色带桃红色，前缘区及后缘区色较暗，无明显斑纹；后翅黄白色；腹部淡赭黄色。

分布 北京。

本种外形似 *Timora lanceolata*，但后者前足胫节端部外侧有一爪，而本种前足胫节端部内侧有一爪，外侧无爪；本种外观亦略似 *Adisura atkinoni*，但后者前翅较宽，外区有一列黑点，前足胫节无爪。

短胫夜蛾属 *Timora* Walker

Timora Walker, 1856, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 9: 132.

Type-species: *Nonagria senegalensis* Guenée.

Sophaga Moore, 1881, Proc. zool. Soc. p. 362.

Dorika Moore, 1881, Proc. zool. Soc.