

翅展 23—25 mm。头、胸、腹及前翅白色，后胸有一黄斑，前翅前缘黑棕色，翅基部一黄斑，内线黄色带状，两侧有细黑线，外线黄色带状，在 7 与 4 脉处各有一分支分别伸向顶角内侧及翅外缘，带的后端达臀角，内缘钝锯齿形，衬以粗黑线，端区有一黄色窄带，内缘衬黑色；后翅白色；腹部背面有浅褐条纹。

分布 湖南、四川。

蜡丽夜蛾属 *Kerala Moore*

Kerala Moore, 1881, Proc. zool. Soc. Lond. p. 329.

Type-species: *Kerala punctilineata* Moore.

Cerala Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 489.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，上缘有毛簇，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛，两触角间有鳞脊；胸部鳞毛混生，后胸有散开的毛簇；腹部无毛簇；前翅稍窄长，顶角略呈长方形，外缘在中褶及臀角处微内削，不成锯齿形，有副室。

种 检 索 表

- 1. 前翅密布暗点 2
前翅暗点稀疏 3
- 2. 前翅全带霉绿 蜡丽夜蛾 *Kerala punctilineata*
前翅后半带霉绿 灰蜡丽夜蛾 *K. grisea*
- 3. 前翅灰带霉绿 黑肾蜡丽夜蛾 *K. decipiens*
前翅前半带紫色 繁蜡丽夜蛾 *K. multipunctata*

黑肾蜡丽夜蛾 *Kerala decipiens* (Butler) (图版 XXXVIII - 18)

Cyana dicipiens Butler, 1879, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 352. (日本)

Cerala decipiens: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 491.

Kerala decipiens: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 798. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 320.

翅展 36—40 mm。头、胸灰色带浅褐色；前翅灰白带霉绿色，前半带紫褐色，各翅脉及前缘区有浅褐点列，内线褐色带状，后半分为二，肾纹黑色新月形，外线黑色微弱，亚端线黑色锯齿形，缘毛紫红杂白色；后翅污白，端区前半带褐色；腹部浅褐灰色。

分布 黑龙江、内蒙古、河南、湖南、四川；日本，俄罗斯。

繁蜡丽夜蛾 *Kerala multipunctata* Moore (图版 XXXVIII - 19)

Kerala multipunctata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 93, pl. 4, fig. 4. (大吉岭)