

及外线黑色，后者锯齿形，基线、内线波浪形，两线间一霉绿色弧形纹，自亚中褶至后缘，外侧衬黑色，剑纹褐色，环纹大，红褐色，肾纹浅黄色有黑褐环，黑边，外线双线，线间霉绿色，亚端线黄绿色锯齿形，两侧衬黑褐色；后翅黄白，端区微褐，横脉纹粗，黑褐色，外线微黑；腹部褐灰色。

分布 陕西、云南；锡金，印度。

基夜蛾属 *Kumasia* Sugi

Kumasia Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 754.

Type-species: *Apamea kumaso* Sugi.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达额中部，第三节短，额光滑，复眼大，触角线形；前、后胸有毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉细弱。

雄蛾抱器瓣腹缘中段拱曲，端缘圆钝。

基夜蛾 *Kumasia kumaso* (Sugi)* (图版 XXIX-12)

Apamea kumaso Sugi, 1963, Tinea, 6: 13, figs. 8, 19. (日本)

Kumasia kumaso: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 754.




图 469 基夜蛾 *Kumasia kumaso* (Sugi) ♂ 外生殖器

翅展 40—50mm。全体灰褐色。前翅基线、内线、中线及外线黑色，除中线外均双线，内线、中线、外线后半均微弱，亚中褶一黑纵线位于内线内方，剑纹褐色，环纹及

* 席客先生提供标本及寄主名称，谨致谢忱。

肾纹褐灰色，亚端线浅褐黄色，后半锯齿形，内侧 3—5 脉间有二黑尖纹，肾纹至亚端线间带黄色，端区带黑色；后翅褐灰，端区色暗，腹部褐灰色。雄蛾抱器瓣腹缘近端部凹（图 469）。

寄主 竹笋。
分布 江苏；日本。

路夜蛾属 *Xenotrachea* Sugi

Xenotrachea Sugi, 1958, Tinea, 4: 184.
Type-species *Hadena albidisca* Moore.

喙发达，下唇须向上伸，复眼大，圆形；胸部主要被鳞片，前、后胸有毛簇，足胫节饰长毛；腹部背面有一列毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉细弱。抱器瓣窄长，背端尖。

种 检 索 表

- 抱钩长，伸出抱器瓣背缘，阳茎有一角状器 秦路夜蛾 *Xenotrachea tsinlinga*
- 抱钩斜向抱器瓣腹缘，阳茎有三个角状器 路夜蛾 *X. albidisca*

路夜蛾 *Xenotrachea albidisca* (Moore) (图版 XXIX - 13)

Hadena albidisca Moore, 1867, Proc. zool. Soc. p. 59, pl. 6, fig. 17. (Bengal)
Trachea albidisca: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 141. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 255.
Xenotrachea albidisca: Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 124.

翅展 30mm。头部褐黄色；胸部黄绿带褐色；前翅褐黄带霉绿色，各横线白色，基




图 470 路夜蛾 *Xenotrachea albidisca* (Moore) ♂ 外生殖器