

分布：四川。

暗弓尺蛾 *Kyrtolitha fuscata* Xue, 1991 (图版 I : 19)

Kyrtolitha fuscata Xue, 1991, Sinozoologia 8: 363, fig. 9, pl. 1: 6. (西藏：江达)

前翅长：♂ 22 mm。额上半部和头顶前端深灰褐色，额下半部和头顶后半部黄白色。下唇须灰褐色。胸腹部背面灰黄褐色，各腹节后缘黑色。翅色和斑纹近似紫弓尺蛾，但色调较灰暗；前翅亚基线与中线之间距离略宽，外线波曲较深；后翅几乎为均匀的灰褐色，外线大部消失，其外侧浅色区域狭窄且极不明显。

雄性外生殖器（图 44）：钩形突端半部略粗但较短。阳端基环较宽大。抱器瓣端部近平截；指状抱器内突较紫弓尺蛾细小，但其外侧增厚区域延长至抱器腹端部。

检视标本：1 ♂ (正模)，西藏江达，3 400m, 1976. VII. 26。

分布：西藏。

张弓尺蛾 *Kyrtolitha avulsa* Prout, 1937 (图版 I : 20)

Kyrtolitha avulsa Prout, 1937, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 73, pl. 7: d. (西藏)




图 45—46 雄性外生殖器. 45. 张弓尺蛾 *Kyrtolitha avulsa* Prout;
46. 长弓尺蛾 *K. pantophrica* Prout

前翅长：♂ 20—22 mm, ♀ 19—21 mm。非常近似紫弓尺蛾。雄触角较光滑，纤毛极短。前翅色调单一，无黄褐或红褐色，浅色部分灰白至浅灰褐色，中带深灰褐色，较紫弓尺蛾略窄。后翅色较浅，大部灰白色，中点弱小近于消失，外线同紫弓尺蛾，翅端部带深灰褐色，无黄褐色。前后翅缘线较清晰。