

Type-species: *Labanda herbealis* Walker.

Gerbatha Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 913.

Lazanda Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 32: 604.

Bariana Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. p. 603.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长，端部稍膨大，额光滑无突起，复眼大，圆形，雄蛾触角线形；胸部主要被鳞片，后胸有毛簇；腹部细长，基部二节背面有毛簇；前翅较窄长，有一长副室。

种 检 索 表

前翅带绿色 绿润皮夜蛾 *Labanda viridaloides*
前翅不带绿色 内润皮夜蛾 *L. semipars*

绿润皮夜蛾 *Labanda viridaloides* Poole (图版 XLV-10)

Labanda viridaloides Poole, 1989, Lep. Cat. Fas. 118: 560. (印度)

Labanda viridalis Swinhoe, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 15: 156. (preoccupied)

Labanda viridalis: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 395, pl. 184, fig. 30. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 406, pl. 38f.

翅展 29mm。头、胸蓝绿色杂少许褐色，翅基片黑褐色为主；前翅蓝绿色，布有白点，内线内方大部黑色，基线、内线及外线黑色，基线两侧衬蓝绿及白色，波浪形，内线波浪形，肾纹黑色窄曲，后端扩散，四周有细黑点，前方一模糊黑斑，外线前半波曲，后半锯齿形，前端两侧各一白点，亚端线白色锯齿形，内侧在 4 脉前有一黑色外斜宽条，4 脉后衬黑色，顶角一外斜白线，两侧黑色，翅外缘一列黑点；后翅与腹部暗褐色。

分布 云南；印度。

内润皮夜蛾 *Labanda semipars* (Walker) (图版 XLV-11)

Bryophila semipars Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1647, (斯里兰卡)

Bocana pamphosalis Walker, 1859, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 19: 887.

Gerbatha laticincta Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 913.

Labanda semipars: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 399. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 407, pl. 38g. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 340.

翅展 23—34mm。头、胸灰褐色杂黑色，颈板黑色，有一浅褐横条；前翅浅褐灰色，密布细黑点，基线、内线及外线黑色，内线、外线波浪形，肾纹黑色，不清晰，在中室上角现一黑纹，外线外侧衬白色，后半较直，亚端线前半为二浅褐曲弧，后半波浪形，内侧衬黑色，端线黑色；后翅灰褐色，外缘有灰色窄条，端线黑色；腹部褐灰色，

毛簇黑色。

分布 海南；印度，斯里兰卡。

瘿皮夜蛾属 *Blenina* Walker

Blenina Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1178, 1214.

Type-species: *Blenina accipiens* Walker.

Eliocroea Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 935.

Amrella Moore, 1882, Lep. Atk. p. 158.

喙发达，下髯须向上伸，第二节达头顶，鳞片细长，第三节中常，有些端部比较宽，额平滑，上方有毛成脊状；雄蛾触角有纤毛；胸部几乎全为鳞片，前胸无毛簇，后胸有扁形毛簇，胫节有毛；腹部基部两节有毛簇；前翅顶角稍钝，外缘曲度平稳，微呈锯齿形，前翅翅脉 3 及 4 从中室下角伸出，6 脉从中室顶角伸出，副室狭长，11 脉自中室伸出；后翅 2 脉自中室下角前方伸出。

种 检 索 表

- 1. 雄蛾下唇须第二节端部前缘凹…………… 绿瘿皮夜蛾 *Blenina chlorophila*
雄蛾下唇须正常…………… 2
- 2. 前翅外缘半凹…………… 柿瘿皮夜蛾 *B. senex*
前翅外缘曲度平稳…………… 枫杨瘿皮夜蛾 *B. quinaria*

绿瘿皮夜蛾 *Blenina chlorophila* Hampson (图版 XLV-12)

Blenina chlorophila Hampson, 1905, Ann. Mag. nat. Hist. 7, 16: 546. (新加坡)

Blenina chlorophila: Hampson, 1912, Car. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 402, pl. 185, fig.

2. ——Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 407. Holloway, 1976, Moths Borneo p.21.

翅展 42mm。头、胸深绿杂白色，颈板与翅基片端部黑色，额有黑横条；前翅底色白，大部带深绿色并布有细黑点，后缘区基部棕色，1 脉前有一黑曲线，各横线黑色，基线波浪形，内线双线波浪形，中线、外线双线锯齿形，肾纹为一黑短条，亚端线不规则锯齿形，内侧有黑斑，顶角一内斜黑影，一黑影自亚端线 6、7 脉间外斜至翅外缘中部，各翅脉端有一黑点；后翅黑褐色，端区近黑色。外线橙色带状，亚中褶端部一橙色短纹；腹部背面黑褐色。

分布 台湾、广东、海南；印度，斯里兰卡，马来西亚，印度尼西亚，新加坡。

柿瘿皮夜蛾 *Blenina senex* (Butler) (图版 XLV-13)

Dandaca senex Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5; 1: 82. (日本横滨)