

**分布** 黑龙江、新疆；土耳其，欧洲。

**异安夜蛾 *Lacanobia aliena* (Hübner) (图版 XVIII-26)**

*Noctua aliena* Hübner, [1809], Eur. Schmett. Noct. pl. 94, fig. 441. (欧洲)

*Polia aliena*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 100. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 298.

*Mamestra aliena*: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p. 76. ——Varga, 1974, Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 66: 312.

*Lacanobia aliena*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 703.

翅展 45mm。头、胸褐色杂灰色及少许黑色；前翅褐色，布有黑棕细点，基线、内线及外线均双线黑色，基、内线波浪形，外线锯齿形，线间灰色，剑纹黑边，外方有浅色纹，环纹有灰白环及黑边，肾纹内缘黑色，中线黑色波浪形，亚端线灰色锯齿形，在 3、4 脉处强外突；后翅褐色；腹部灰褐色。

**寄主** 翘摇属植物。

**分布** 黑龙江、新疆、甘肃；日本，欧洲。

**华安夜蛾 *Lacanobia splendens* (Hübner) (图版 XVIII-27)**

*Noctua splendens* Hübner, [1808] 1827, Eur. Schmett., Noct. pl. 85, fig. 400. (欧洲)

*Polia splendens*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 135. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 299.

*Lacanobia splendens*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 704.

翅展 29—31mm。头、胸及前翅紫褐色，前翅前缘区较灰，亚中褶基部一褐斑，基线白色，内线棕色，剑纹棕色，环纹、肾纹灰色，后者后半为深褐斑，中线深褐色，外线棕色锯齿形，齿尖为长点状，亚端线白色，在 3、4、7 脉处外突，线内侧一深棕色窄带；后翅浅褐黄色，翅脉及端区褐色；腹部褐黄色。

**寄主** 酸模、车前等属。

**分布** 黑龙江、新疆；朝鲜，欧洲。

**白线安夜蛾 *Lacanobia pisi* (Linnaeus) (图版 XVIII-28)**

*Phalaena Noctua pisi* Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 517. (欧洲)

*Polia pisi*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 136. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 300.

翅展 34mm。头、胸暗褐色；前翅紫棕色，基线灰色波浪形，内线双线黑褐色，线间灰色，波浪形，剑纹、环纹、肾纹均灰色，环、肾纹大，中线模糊，外线黑棕色锯齿形，外方一系列灰白点，亚端线黄白色，在 3、4 脉处大锯齿形，线内侧有二黑棕纹；后

翅浅褐色；腹部灰褐色。雄蛾抱器瓣背缘端部波曲，抱钩长棒状（图 351）。




图 351 白线安夜蛾 *Lacanobia pisi* (Linnaeus) ♂ 外生殖器

寄主 蕨类、山萝卜等。

分布 黑龙江、新疆；蒙古，欧洲。

### 草安夜蛾 *Lacanobia oleracea* (Linnaeus) (图版 XVIII-29)

*Phalaena Noctua oleracea* Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 517. (欧洲)

*Polia oleracea*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 135.

*Lacanobia oleracea*: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 703.

翅展 40mm。头、胸及前翅红棕色，布有细白点，前翅翅脉微白，翅基部一白毛




图 352 草安夜蛾 *Lacanobia oleracea* (Linnaeus) ♂ 外生殖器