

分叉，抱器腹延伸为一突（图 653）。




图 653 佩夜蛾 *Oxyodes scrobiculata* (Fabricius) ♂ 外生殖器

寄主荔枝、龙眼。

分布湖南、福建、广东、海南、广西、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚。

戟夜蛾属 *Lacera* Guenée

Lacera Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 336.
Type-species: *Phalaena alope* Gramer.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，基部宽，第三节短，雄蛾触角有短纤毛；胸部及腹部具粗毛和鳞片，胫节有毛簇，前翅翅尖尖形，外缘中部凸成一角，缘毛锯齿形，后翅缘毛锯齿形，在 M_1 和 M_3 成二小尖齿。

幼虫腹足四对俱全，但前两对不发达。

种 检 索 表

1. 前翅端区中部有暗斑 2
- 前翅端区中部无暗斑 波戟夜蛾 *Lacera noctilio*
2. 前翅亚中褶有一宽肥斑 斑戟夜蛾 *L. procellosa*
- 前翅亚中褶有一尖舌纹 戟夜蛾 *L. alope*

波戟夜蛾 *Lacera noctilio* (Fabricius) (图版 LXI-9)

Noctua noctilio Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3, 2: 12. (India Orientali)

Lacera noctilio: Holloway, 1979, Lep. New Caled. p. 503. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 111. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 865.

翅展 45 mm。头部、胸部及前翅褐色，额有白斑，前翅前缘区大部暗灰褐色，有细白点，基线仅前端现一黑纹，内线黑色间断，中线模糊黑色波浪形，后半明显，肾纹黄白色，中有褐纹，外线黑色，在 6 脉折角内斜，后半锯齿形，肾纹外有数条黑褐纵纹，中线、外线后段之间色浅，亚端线黄白色，锯齿形，外侧有黑褐斜条，线外方另一黄白线，外侧衬细黑条；后翅深褐色，外线黑褐衬黄白色，波浪形，亚端线黄白色波浪形，外方褐黑色；腹部暗灰褐色。

寄主 云实属。

分布 海南；印度，斯里兰卡，新喀里多尼亚。

斑戟夜蛾 *Lacera procellosa* Butler (图版 LXI-7)

Lacera procellosa Butler, 1877, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 4: 368. (日本横滨)

Lacera procellosa: Holloway, 1975, Lep. New Caled. p. 502. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 864.

翅展 54 mm。头、胸及前翅暗棕色，额有白斑，前翅基线、内线及外线棕黑色，前者仅前端明显，内线波浪形，肾纹隐约可见一黄斑，后方一黑边葫芦形大斑，其后再一浅黄斑，外线双线，后半波浪形，亚端线浅黄色，外线外方大部浅黄色，端区中部一黑褐斑；后翅棕色，亚端线黑色，外方一白线，中褶处一褐黄斑，端区一褐黑窄带；腹部棕色。雄蛾抱器瓣端部窄，背侧一粗突，端尖，阳茎细长（图 654）。




图 654 斑戟夜蛾 *Lacera procellosa* Butler ♂ 外生殖器

寄主 云实属。

分布 湖南、台湾、江西、海南、西藏；日本，印度，斯里兰卡，菲律宾，印度