

分布：台湾。

淡网尺蛾 *Laciniodes denigrata* Warren, 1896

Laciniodes denigrata Warren, 1896, Novit. zool. 3: 316. (印度)

Asthenes plurilinearia ab. *denigrata*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 273.

寄主植物：李属。

分布：中国，日本，俄罗斯，朝鲜，蒙古，印度。

中国分布下述两个亚种。

乌苏里亚种 subsp. *ussuriensis* Prout, 1938 (图版XXI: 3)

Laciniodes denigrata ussuriensis Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 181. (俄罗斯：乌苏里地区)

前翅长：♂ 11—13 mm，♀ 13—14 mm。与下述亚种差异甚小。平均体型较小，翅色略深，带姜黄色；前翅内线在中室内弯曲，一般不形成折角。

检视标本：1 ♂，黑龙江亚布洛尼，1938. VII. 14；1 ♀，黑龙江五常，1970. VII. 8；1 ♂，黑龙江岱岭，390 m，1959. VIII. 5；6 ♂ 2 ♀，同前，1962. VI. 3—VIII. 18；2 ♂，黑龙江伊春，1957. VI. 15、20；1 ♀，吉林漫江，1955. VIII. 11；1 ♂，辽宁清原，1954. VII. 30。

分布：黑龙江、吉林、辽宁；日本，朝鲜，俄罗斯东南部。

四川亚种 subsp. *abiens* Prout, 1938 (图版XXI: 4)

Laciniodes denigrata abiens Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 181. (四川：Putu-fong)

前翅长：♂ 12—16 mm，♀ 13—17 mm。额上部及头顶黄白色，额下部深褐色，有一个很小的额毛簇；下唇须褐色，略长，近 1/3 伸出额外。翅黄白色至灰黄色，斑纹褐色，略带红褐色，斑纹形式与网尺蛾相近似，但颜色较浅，外线和顶角下的斜线以及亚缘线白点周围均不带黑褐色；前翅内线在中室内形成折角。

雄性外生殖器（图 947）：钩形突细。阳茎基环侧突细长，端部膨大部分十分瘦狭，形状规则。抱器瓣狭长，宽度较均匀。阳茎短粗，角状器为一束浓密短小细刺。

雌性外生殖器（图 953）：骨环发达，长宽相近。囊体葫芦形，上半部侧面弱骨化。囊片近圆形，边缘不整齐。

检视标本：1 ♂ 5 ♀，北京百花山，1972. VIII. 1、4；2 ♂ 1 ♀，山西霍县，1 550 m，1972. VII. 28、29；2 ♀ 5 ♂，甘肃永登连城，2 000 m，1987. VI—VII；2 ♀，青海湟中，1977. VII. 16；15 ♂ 6 ♀，湖北神农架，1 800 m，1981. VIII. 1—5；2 ♂，