




图 949—950 雄性外生殖器. 949. 匀网尺蛾 *Laciniodes stenorhabda* Wehrli;
950. 隐网尺蛾 *L. conditaria* (Leech)

后者几乎扩展到臀角附近；缘线黑褐色，在前翅仅有极微小的断离；缘毛黄白色，在翅脉端掺杂少量灰褐色。翅反面灰白色，基半部散布灰褐色，中线、中点和外线几乎同正面，翅端部的褐带较模糊，在后翅亦存在较弱的灰褐色亚缘带。

雄性外生殖器（图 948）：极近似四川淡网尺蛾。但阳茎基环侧突端部更为膨大；囊形突较短宽；阳茎明显粗大，刺束浓密。

检视标本：1 ♂（正模），湖南桑植天平山，1981. VI. 11。

分布：湖南。

匀网尺蛾 *Laciniodes stenorhabda* Wehrli, 1931 (图版 XXI: 6)

Laciniodes stenorhabda Wehrli, 1931, N. Beitr. syst. Insektenk. 5: 27. (华西)

前翅长：♂ 14—16 mm，♀ 14—17 mm。额及头顶黄白色，下唇须背面褐色。胸腹部背面黄白色。翅白色，斑纹浅黄褐色，无任何褐斑，翅面斑纹为典型的网状，较细密；各线条颜色均匀，均无明显加深。前翅中点黑色，极小；外线直，在 M_3 处不向外凸；顶角处无深色斜线。

雄性外生殖器（图 949）：钩形突细小。阳茎基环侧突细长，端部不规则形膨大。抱器瓣狭长，中部附近明显窄缩。阳茎短粗，角状器为一束浓密细刺。

雌性外生殖器（图 954）：骨环发达，宽大于长。囊体肾形，上侧面弱骨化。囊片微小，形状不规则，位于囊体底部。

检视标本：2 ♂，黑龙江岱岭 390 m，1957. VIII. 12；1 ♂ 1 ♀，福建武夷三港，




图 951—954 雌性外生殖器。951. 单网尺蛾 *Laciniodes unistirpis* (Butler);
952. 假隐网尺蛾 *L. pseudoconditaria* (Sterneck); 953. 四川淡网尺蛾
L. denigrata abiens Prout; 954. 匀网尺蛾 *L. stenorhabda* Wehrli

1983. VI. 7、9; 1 ♂, 四川泸定新兴, 1 900 m, 1983. VI. 14; 9 ♂ 8 ♀, 云南丽江玉龙山, 2 900—2 950 m, 1962. VI. 25—VII. 30; 2 ♂ 2 ♀, 同前, 2 800—3 200 m, 1984. VII. 14、15; 1 ♂, 云南维西攀天阁, 2 920 m, 1981. VII. 22。

分布：黑龙江、福建、四川、云南、西藏。

隐网尺蛾 *Laciniodes conditaria* (Leech, 1897) (图版XXI: 7)

Asthena conditaria Leech, 1897, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 20: 85. (四川：打箭炉)

Laciniodes conditaria: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 182.

前翅长：♂ 15 mm。下唇须深褐色，基部白色。额、头顶和胸腹部背面白色散布黑褐色鳞。前翅白色，斑纹褐色，基部至内线、中线至外线和翅端部线纹分别扩散融合，形成块或带状，极难分辨网状纹；中点黑色圆形，周围有白边；外线外侧的白色带狭窄，外侧边缘模糊，带内不被褐色线分割；亚缘线为一列模糊白点，周围颜色不加深。后翅白色，在近后缘处排列数条模糊灰色线纹，无网状纹；中点黑灰色微小；翅端部颜色略深，隐见亚缘线的白点列。前翅反面基部至外线为均匀的褐色，外线外侧及后翅黄白色，两翅中点同正面。

雄性外生殖器 (图 950)：钩形突粗壮，基半部近三角形。阳茎基环侧突较粗大，