




图 844—845 雄性外生殖器. 844. 圆丽翅尺蛾 *Lampropteryx rotundaria* (Leech);
845. 犀丽翅尺蛾 *L. chalybearia* (Moore)

分布：四川、云南、西藏。

犀丽翅尺蛾 *Lampropteryx chalybearia* (Moore, 1868) (图版 XIX: 4)

Cidaria chalybearia Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 663. (印度：大吉岭)

Scotosia incola Bastelberger, 1911, Ent. Rundsch. 28: 22.

Lampropteryx chalybearia: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 296, pl. 29: e.

Calocalpe (?) *chalybearia*: Inoue, 1978, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 14: 222.

前翅长：♂ 18—20 mm。♂ 触角锯齿较弱，纤毛长度小于触角干直径。头深褐色，下唇须短粗。胸部背面深灰褐色至黑褐色，腹部色较浅。♂ 腹部末端具四对极发达的味刷，外露的毛长度大于前种，深灰褐色。翅较短宽，后翅宽阔，端部圆。前翅黑褐色（偶有色较浅），有强烈光泽，由翅基部至外线黑褐色底色与灰褐色至深灰褐色波纹交替排列，中域色较深，中点黑色短条状；外线波状，在 M 脉之间凹，中部凸出；外线外侧排列 2—3 条浅色波纹，亚缘线浅色细锯齿状，细弱模糊，有时在翅脉间形成形成小白点。后翅灰褐至深灰褐色，隐见深色中点。前后翅缘毛深浅相间。翅反面灰褐至深灰褐色，前后翅亚缘线为一列清晰白点，其它斑纹模糊或消失。♂ 后翅反面后缘中部毛簇十分浓密，黑灰色。

雄性外生殖器（图 845）：钩形突短粗，末端钝圆。阳茎基环侧突短粗，端部膨大，

大刺弱小，端半部特别纤细，末端纤毛短小。抱器瓣短宽，端部略向抱器背方向凸伸。囊形突半圆形。阳茎远较本属其它种类长，角状器一支极细长，第二支近于退化。

检视标本：2 ♂，福建武夷三港，1980. X. 24；1 ♂，四川雅江兵站，3 800 m，1982. VIII. 24；2 ♂，云南屏边，1 500 m，1956. VI. 18；1 ♀，云南腾冲胆扎林场，2 500 m，1992. VI. 2—4；1 ♂，西藏墨脱马尼翁，930 m，1974. VIII. 26。

分布：福建、台湾、四川、云南、西藏；印度，锡金。

吉丽翅尺蛾 *Lampropteryx jameza* (Butler, 1878)

Cidaria jameza Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. (5) 1: 452. (日本)

Cidaria askoldaria Oberthür, 1880, Études d'Ent. 5: 57, pl. 9: 9.

Cidaria (*Calostigia*) *albigirata* (part.) Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 229, pl. 9: b. (nec Kollar, [1844])

Cidaria (*Colostygia*) *jameza*: Prout, 1938, ibidem 4 (Suppl.): 129.

Colostygia jameza: Prout, 1939, ibidem 12: 267.

Lampropteryx jameza: Inoue, 1976, Tinea 10 (2): 16.

Coenotephria jameza: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 573.

寄主植物：拉拉藤。

分布：内蒙古东部、山西、甘肃、青海、四川；日本，朝鲜，俄罗斯。

中国记载下述两个亚种。

指名亚种 subsp. *jameza* (Butler, 1878)

特征与下一亚种十分接近。颜色较深，前翅中域和翅端部近前缘处深褐色，白色亚缘线粗壮鲜明；后翅端部浅褐色，可见白色波状亚缘线。

未见标本。

分布：内蒙古东部；日本，朝鲜，俄罗斯。

四川亚种 subsp. *viperata* (Alphéraky, 1897) (图版 XIX: 9)

Cidaria viperata Alphéraky, 1897, Rom. Mem. 9: 72. (四川)

Larentia albigirata var. *viperata*: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaearct. Faunengeb. 1: 294.

Cidaria (*Calostigia*) *albigirata viperata*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 229.

Cidaria (*Colostygia*) *jameza viperata*: Prout, 1938, ibidem 4 (Suppl.): 129.

前翅长：♂ ♀ 14—16 mm。♂ 触角双栉形，栉齿长大于触角干直径的 2 倍。下唇须深褐色，腹面白色，1/3 伸出额外。额具发达额毛簇；额、头顶和体背白色与褐色掺杂，其中胸部背面色较深，第一、二腹节背中线两侧有黑褐色斑。前翅颜色远较举剑丽