

## 绒夜蛾属 *Lasiestra* Hampson

*Lasiestra* Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 47.

Type-species: *Dianthoecia phoca* Moschler.

喙发达, 下唇须向上伸, 第三节下缘有长毛, 额平滑, 眼大, 圆形, 有睫毛, 头部与胸部被粗毛, 无毛簇, 足胫节有粗毛; 腹部基部几节背面有毛簇; 前翅外缘斜曲, 有副室; 后翅 6、7 脉共柄。

### 种 检 索 表

前翅线纹明显 ..... 霉灰绒夜蛾 *Lasiestra deliciosa*  
前翅线纹模糊 ..... 黑褐绒夜蛾 *L. dovrensis*

#### 霉灰绒夜蛾 *Lasiestra deliciosa* (Alpheraky) (图版 XVII-19)

*Dianthoecia deliciosa* Alpheraky, 1892, Hor. Soc. ent. ross. 26: 446. (Amdo 地区, 近 Sinin, Ljan-dsha-sjana)

*Lasiestra deliciosa*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 51. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 85, pl. 21c.

翅展 36mm。头部与胸部霉灰色杂有少许黑色, 颈板灰白色, 边缘黑色; 各足跗节节间有灰白斑; 前翅霉灰色, 布有黑褐细点, 基线双线黑色, 波浪形, 自前缘脉至 1 脉, 内线双线黑色, 波浪形, 剑纹小, 黑边, 环纹近圆形, 内外缘黑色, 肾纹黑边, 中线黑色, 波浪形, 外线双线黑色, 锯齿形, 齿尖在翅脉上为点状, 自前缘脉后外弯, 4 脉后内斜, 亚端线黑色, 在中褶与亚中褶处为凸, 翅外缘有一列三角形黑点, 缘毛褐白色; 后翅黑褐色, 隐约可见灰色亚端线, 缘毛白色; 腹部霉绿灰色。

分布 青海; 克什米尔地区。

#### 黑褐绒夜蛾 *Lasiestra dovrensis* (Staudinger) (图版 XVII-20)

*Dianthoecia dovrensis* Stsuginer, 1864, in Wocke, Stett. ent. Z. p. 182. (挪威)

*Lasiestra dovrensis*: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 50. —Kozhantschikov, 1947, Ent. Obozr. 22 (1-2): fig. 2; 10.

*Lasionycta dovrensis altaica*: Varga, 1974, Ann. Hist. nat. Mus. Nat. Hung. 66: 316.

翅展 36mm。头、胸及前翅黑褐色, 后者密布灰色细点, 基线、内线及外线黑色衬白色, 基线、内线波浪形, 外线深锯齿形, 剑纹、环纹及肾纹均小, 灰色黑边, 亚端线灰色, 内侧有一列黑齿纹; 后翅与腹部褐色。

分布 新疆; 欧洲。