

Hadena elwesi Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 200.

Lasiestra elwesi: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 297.

翅展 30mm。头、胸白色杂浅褐色；前翅紫灰色密布细黑点，部分带黑色，基线、内线均双线黑色，后者波浪形，剑纹小，环纹近方形，肾纹中常，两纹均灰白色，外线黑色锯齿形，齿尖为黑、白点，亚端线灰白色；后翅污褐色；腹部灰褐色。雄蛾钩形突短宽，抱钩粗长，伸出瓣腹缘（图 340）。

分布 四川、西藏；锡金，不丹，中亚地区。

绿黄茸夜蛾 *Lasionycta lurida* (Alpheraky) (图版 XVII-22)

Dianthoecia lurida Alpheraky, 1892, Hor. Soc. ent. ross. 26: 447. (Amde 地区: Guj-Guj, Myn-dyn-scha)

Polia tenebra Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 87.

Lasionycta lurida: Hampson, 1905, ibid, p. 56. —Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 85, pl. 21c.

翅展 36mm。头、胸红褐杂黑色及少许白色；前翅褐色，基部杂绿黄色，基线、内线均双线褐黑色波浪形，剑纹、环纹及肾纹均围黑边，肾纹后端稍内突，中、外线褐黑色，后者锯齿形，外侧衬灰白色，亚端线灰白色，内侧一系列黑齿纹；后翅浅黄，可见暗褐色外线与亚端线；腹部红褐色。

分布 青海；克什米尔地区。

霉茸夜蛾 *Lasionycta bryoptera* (Püngeler) (图版 XVII-23)

Mamestra bryoptera Püngeler, 1900, 1899, Iris, 12: 292, pl. 9, fig. 6. (青海湖区)

Lasionycta bryoptera: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 55. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 297.

翅展 36mm。头、胸及前翅霉黄色，前翅密布细黑点，翅脉黑色，基线、内线及外线均双线黑色，基、内线波浪形，外线锯齿形，各双线间均灰色，剑纹小，环、肾纹黑色，中线黑色，亚端线黄白色锯齿形，内侧一系列新月形黑点；后翅浅褐灰色，除端区外均带黑褐色，端区稍黄；腹部褐黄色。

分布 青海、西藏。

寒茸夜蛾 *Lasionycta orientalis* (Alpheraky) (图版 XVII-24)

Dianthoecia orientalis Alpheraky, 1882, Hor. Soc. ent. ross. 17: 71, pl. 2, fig. 52. (天山?)

Polia orientalis: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 75.

Lasionycta orientalis: Varga, 1973, Mitt. Munch. ent. Ges. 63: 219. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 82.

翅展 35mm。头、胸、腹及前翅灰色杂褐色，前翅密布黑褐细点，亚中褶基部一黑纹，基线、外线均双线黑色，外区翅脉较黑，内线、中线黑色，环、肾纹浅褐色，剑纹褐色，前者椭圆形，有白边及黑边，亚端线灰色；后翅褐色。雄蛾抱钩长棘形，内突短棘形（图 341）。




图 341 寒茸夜蛾 *Lasionycta orientalis* (Alpheraky) ♂ 外生殖器

分布 新疆；蒙古。

近灰茸夜蛾 *Lasionycta proxima* (Hübner) (图版 XVII-25)

Noctua proxima Hübner, [1809] 1827, Eur. Schmett., Noct. pl. 87, fig. 409. (欧洲)

Hada cana Eversmann, 1941, Bull. Mosc. Soc. 1: 29.

Polia proxima: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 73. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 83.

Lasionycta proxima: Varga, 1974, Ann. Hist. Nat. Mus. nat. Hung. 66: 316.

翅展 33mm。头、胸及前翅灰色，头、胸杂黑褐色。前翅亚中褶一波曲黑纹，后缘基部一灰白斜纹，基线、内线及外线均双线黑色，基、内线波浪形，剑纹大，环纹斜窄，肾纹大，环、肾纹灰白色黑边，中线黑色，亚端线灰色，内侧衬暗褐色，外区翅脉黑色；后翅褐色；腹部黄褐色。

分布 黑龙江、新疆；欧洲。

宁茸夜蛾 *Lasionycta nana* (Hufnagel) (图版 XVII-26)

Phalaena nana Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3: 398. (德国)

Noctua dentina [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 82.

Scotogramma nana: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 26.