

翅展 35mm。头、胸、腹及前翅灰色杂褐色，前翅密布黑褐细点，亚中褶基部一黑纹，基线、外线均双线黑色，外区翅脉较黑，内线、中线黑色，环、肾纹浅褐色，剑纹褐色，前者椭圆形，有白边及黑边，亚端线灰色；后翅褐色。雄蛾抱钩长棘形，内突短棘形（图 341）。




图 341 寒茸夜蛾 *Lasionycta orientalis* (Alpheraky) ♂ 外生殖器

分布 新疆；蒙古。

近灰茸夜蛾 *Lasionycta proxima* (Hübner) (图版 XVII-25)

Noctua proxima Hübner, [1809] 1827, Eur. Schmett., Noct. pl. 87, fig. 409. (欧洲)

Hada cana Eversmann, 1941, Bull. Mosc. Soc. 1: 29.

Polia proxima: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 73. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China Lep. Noct. 4: 83.

Lasionycta proxima: Varga, 1974, Ann. Hist. Nat. Mus. nat. Hung. 66: 316.

翅展 33mm。头、胸及前翅灰色，头、胸杂黑褐色。前翅亚中褶一波曲黑纹，后缘基部一灰白斜纹，基线、内线及外线均双线黑色，基、内线波浪形，剑纹大，环纹斜窄，肾纹大，环、肾纹灰白色黑边，中线黑色，亚端线灰色，内侧衬暗褐色，外区翅脉黑色；后翅褐色；腹部黄褐色。

分布 黑龙江、新疆；欧洲。

宁茸夜蛾 *Lasionycta nana* (Hufnagel) (图版 XVII-26)

Phalaena nana Hufnagel, 1766, Berl. Mag. 3: 398. (德国)

Noctua dentina [Denis et Schiffermüller], 1775, Schmett. Wien. p. 82.

Scotogramma nana: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 26.