

体长 12mm 左右；翅展 37mm 左右。头部与颈板褐灰色；胸部背面黑褐色杂灰色，前、中足外侧黑色，距及跗节有淡褐斑，后足灰黄色，跗节有黑斑；前翅底色褐灰，除端区外大部带有黑色及褐色光泽，基线双线黑色，只达中脉，内线双线黑色，波浪形外斜，环纹褐色，中央黑色，肾纹褐色，内半有黑纹，两侧边线黑色，前后端开放，中线黑色，粗，在亚中褶处较扩大，外线双线黑色，微呈锯齿形，亚端线褐灰色，前、后端内侧明显衬以黑色，5—7 脉间有二黑纵条伸至外线，端线为一列新月形黑点，缘毛暗褐色，中央有淡褐黄色波浪形线；后翅褐色，有光泽；腹部褐灰色。

分布 湖南、云南。

铅色毡夜蛾 *Lasiplexia chalybeata* (Walker) (图版 XXXII-15)

Mamestra chalybeata Walker, 1865, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 32: 665. (大吉岭)

Lasiplexia chalybeata: Hampson, 1908, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 7: 485. ——Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 33.

翅展 53mm。头、胸深褐色杂灰色；前翅灰褐色，有细黑点，翅脉及端区有银蓝细点，基线、内线均双线黑色波浪形，剑纹短粗，环纹、肾纹灰色，后者有白点，中线模糊黑色，外线双线黑色锯齿形，外一线弱，亚端线灰白色，锯齿形，内侧衬黑褐色；后翅微黄带褐，端区色暗；腹部暗褐色。

分布 西藏；锡金，印度。

月纹毡夜蛾 *Lasiplexia semirena* Draudt (图版 XXXII-16)

Lasiplexia semirena Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 103, pl. 7, fig. 10. (天目山)

Lasiplexia semirena: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 263.

翅展 32mm。头、胸及前翅红棕色，基线、内线黑色，两线前端相连于前缘脉，其后波浪形，均只达亚中褶，环纹极斜，前窄后宽，前、后端开放，内方有一黑色三角形斑，中线黑色，粗，外斜至肾纹，自肾纹后端直线内斜，在前缘及中室处黑色很浓，肾纹白色，前窄后圆，后半有一略呈半圆形的黑斑，边缘黑色，外线前段黑色外伸，自 7 脉后为各脉上的黑点和白点，2 脉后为细黑色波浪形线，亚端线淡土红色，前端内侧衬黑色，缘毛基部土红色；后翅褐色；腹部暗褐色。

分布 浙江、福建、江西。

衫夜蛾属 *Phlogophora* Treitschke

Phlogophora Treitschke, 1825, Schmett. Eur. 5: 369.

Type-species: *Phalaena meticulosa* Linnaeus.