

后翅 4 岔形，但 5 脉稍远离中室下角。

姗夜蛾 *Latirostrum bisacutum* Hampson (图版 LXV-27)

Latirostrum bisacutum Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 69, fig. 36. (锡金)

Latirostrum japonicum Miyake, 1909, Bull. College Agric. Tokyo Imp. Univ. 8: 149.

Latirostrum bisacutum: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 902. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p. 372, pl. 26, fig. 3.

翅展 50 mm。头部与胸部土黄色，布有零星细黑点，下唇须长，向前平伸，第二节上缘饰长毛，向端部毛渐短，第三节细，端部似匙形，下胸浅黄色，足胫节外侧带有暗褐色，跗节后几节有黑褐斑；前翅土黄色，散布黑色细点，基线不明显，内线褐色，大锯齿形，在中室后内斜，环纹只现一黄点，肾纹小，黄色，中有一土黄色纹，中线褐色，曲度与内线相似，与内线距离较近，在中室后缘外突，外线褐色，锯齿形，自前缘脉外斜至 4 脉折角内斜，外线与中线之间色较浅，亚端线白色，不规则波曲，与外线之间带有褐色，外侧在亚中褶处衬以黑色，亚端线外方布有微黑细纹，波曲形，翅外缘有一列黑点，大小不一，翅形窄长，前后缘外半近平行，顶角外突而尖，在 4 脉处外突成一尖齿，顶角与 4 脉间明显凹陷；后翅黑褐色，前缘区及外缘毛淡黄色；腹部背面黑褐色，腹部褐黄色。

分布 西藏；日本，印度，锡金。

脊胸夜蛾属 *Corcobara* Moore

Corcobara Moore, 1882, Lep. Atk. p. 186.

Type-species: *Corcobara angulipennis* Moore.

喙发达，下唇须向前平伸，第二、三节长，两侧被密毛，额有一尖毛簇；胸部被鳞为主，无毛簇；前翅前、后缘亚平行，顶角尖而外突，外缘中部折曲成齿，后缘拱曲，臀角不显，有一副室；后翅较长，5 脉发达，自中室下角发出。

脊胸夜蛾 *Corcobara angulipennis* Moore (图版 LXV-28)

Corcobara angulipennis Moore, 1882, Lep. Atk. p. 186, pl. 6, fig. 16. (斯里兰卡；大吉岭)

Corcobara thwaitesi Moore, [1885] 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 218.

Corcobara angulipennis: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 69, text fig. 37.

翅展 40 mm。头部与胸部暗红褐色，足跗节各节间褐黄色；前翅红褐色，密布暗褐色细横纹，各横线均不显，肾纹隐约可见二暗褐点，翅外缘前半微锯齿形，后半斜削；后翅黄色，近顶角处有一扁圆形褐黑斑；前翅反面黄色，前缘脉及翅外缘有暗褐色，中室横脉有二黑褐点，亚端区有一黑褐曲带，前宽后窄；后翅反面黄色，近顶角有